

Hemorol, 12 czopków

Cena: 23,10 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEMOROL
Opakowanie	12 czopków
Postać	Czopek
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Ból, Hemoroidy, Stan zapalny
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Hemorol to preparat w formie czopków doodbytniczych, który od dawna stosuje się w przypadku dolegliwości towarzyszących żylakom odbytu oraz w stanach przewlekłego zapalenia błony śluzowej odbytu. Ponadto, jest on również wykorzystywany w celu łagodzenia podrażnień i pęknięć błony śluzowej odbytu.

Wskazania

Lek Hemorol stosuje się w:

- przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

Działanie

Ściągające, przeciwzapalne i rozkurczające.

Dawkowanie

Dorośli: 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.

Skład

1 czopek (2 g) zawiera:

- substancje czynne: benzocainum 100 mg, wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika 80 mg i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba, Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) ekstrahent: etanol 40% V/V, wyciąg gęsty z kwiatu rumianku 50 mg (Matricariae extractum spissum) (3:1), ekstrahent: woda oczyszczona, wyciąg gęsty standaryzowany z korzenia pokrzyku 20 mg (Belladonnae radice extractum spissum normatum): od 11,12 mg do 20 mg wyciągu gęstego z korzenia pokrzyku (4:1) (Belladonnae radice extractum spissum (4:1)), ekstrahent: etanol 70 % (V/V) i od 0 mg do 8,88 mg glicerolu,

- substancje pomocnicze to: glicerol, tłuszcz stały.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hemorol:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- nadwrażliwość na benzokainę, rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae),
- w przypadku choroby nowotworowej jelita grubego.

Działania niepożądane

- methemoglobinemia,
- reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia

- W przypadku obecności krwi w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas aplikacji może pojawić się bolesność uciskowa, która ustępuje po rozpuszczeniu się czopka (ok. 5-10 minut).
- Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.