

Heparin Hasco Forte żel 1000 j.m./g 35 g

Cena: 25,75 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEPARIN
Opakowanie	35 g
Postać	Żel
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Obrzęk, Siniaki, Stłuczenie, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Heparin-Hasco Forte to produkt leczniczy w postaci żelu przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Jego aktywnym składnikiem jest heparyna, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo. Żel Heparin-Hasco Forte jest stosowany jako wsparcie w leczeniu chorób naczyń powierzchniowych, w tym stanów zapalnych żył, zakrzepowego zapalenia żył oraz żylaków kończyn dolnych. Ponadto, jest on również używany w łagodzeniu objawów takich jak obrzęki, stłuczenia oraz krwiaki podskórne.

Wskazania

Leczenie wspomagające chorób żył (zapalenia żył, zakrzepowego zapalenia żył, żylaków kończyn dolnych) oraz obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.

Działanie

Przeciwobrzękowe, przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli: pasek żelu o długości 3-10 cm nanosić na zmienione chorobowo miejsce 2-3 razy na dobę.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: heparynę sodową 1000 j.m.,
- substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, polisorbát 20, aromat różany AR 0287, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Kiedy nie należy stosować leku Heparin-Hasco forte:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku,
- na otwarte, krwawiące i sącące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,
- ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zdiagnozowaną skazą krwotoczną.
- Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.
- Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy odstawić.
- Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.