

Herbion na kaszel mokry 7 mg/ ml, syrop, 150 ml



Cena: 18,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Syrop **Herbion** na kaszel mokry 7 mg/ml to roślinny lek wykrztuśny stosowany w leczeniu mokrego kaszlu. Substancją czynną jest suchy wyciąg z liści bluszczu (*Hedera helix* L., folium). Produkt nie zawiera cukru.

Wskazania

Herbion to produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

Działanie

Wykrztuśne w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

Dawkowanie

- Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież powyżej 12. roku życia: stosowana dawka leku wynosi 5-7,5 ml syropu 2 razy na dobę;
- Dzieci od 6 do 11 lat: stosowana dawka leku wynosi 5 ml syropu 2 razy na dobę;
- Dzieci od 2 do 5 lat: zazwyczaj stosowana dawka leku dla wynosi 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: suchy wyciąg z liści bluszczu (*Hedera helix* L., folium) (5-7,5:1) 7 mg; ekstrahent: etanol 30% (m/m).
- pozostałe składniki: sorbitol ciekły (niekryształujący) (E420), glicerol (E422), benzoosan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330), substancja smakowo-zapachowa Lemon balm Flavour: glikol propylenowy (E1520), etanol, olejek eteryczny cytronelowy, olejek eteryczny cytrynowy, cytral, olejek eteryczny kolendrowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (bluszcz) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
- dzieci poniżej 2. roku życia.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nudności,
- wymioty,
- biegunka,
- reakcje alergiczne objawiające się pokrzywką, wysypką, oraz trudnością w oddychaniu (duszność),
- ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna), która może objawiać się obrzękiem ust, języka, twarzy i/lub gardła, trudnościami w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech).

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, gorączki, pojawienia się ropnej plwociny (zawierającej ropę) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeżeli objawy nie ustępują po 7 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy przyjmować produktu z innymi lekami hamującymi kaszel (leki przeciwkaszlowe, takie jak kodeina czy dekstrometorfan) bez konsultacji lekarskiej.
- Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z problemami żołądkowymi (zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka).
- Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

Producent

KRKA