

HERPEX krem, 2g

Cena: 13,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	2 g
Postać	krem
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Herpex to lek w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę, powodując ryzyko wirusem opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV). Krem przeciwwirusowy Herpex jest dostępny bez recepty

Wskazania

Herpex to krem przeciwwirusowy dla dzieci i dla dorosłych do stosowania miejscowego w leczeniu zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpes simplex typu 1 i 2. Może być stosowany miejscowo w leczeniu ospy wietrznej.

Działanie

Krem Herpex zawiera substancję czynną acyklowir - lek przeciwwirusowy, który działa silnie na wirusy opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV).

Dawkowanie

Lek na opryszczkę Herpex należy nakładać cienką warstwą na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny (z przerwą nocną).

Skład

Substancją czynną kremu jest acyklowir (Aciclovirum).

Pozostałe składniki: makroglicerydów stearyniany, dimetykon 350, alkohol cetylowy, wazelina biała, parafina ciekła, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Herpex na opryszczkę.

Działania niepożądane



- Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): przemijające uczucie pieczenia lub kłucia; nieznaczne wysuszenie skóry; złuszczenie skóry, świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): rumień; kontaktowe zapalenie skóry.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Leku przeciwwirusowego Herpex nie wolno stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, oczu lub pochwy), ze względu na możliwość podrażnienia;
- Należy unikać kontaktu kremu z oczami;
- Stosowanie kremu na opryszczkę na narządy płciowe i w okolicy odbytu może zmniejszyć wytrzymałość prezerwatywy z lateksu na rozdarcie;
- Parafina i wazelina zawarte w leku Herpex mogą zmniejszyć bezpieczeństwo stosowania prezerwatyw;
- Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami odporności (np. pacjenci zakażeni wirusem HIV lub po przeszczepieniu szpiku kostnego) przed rozpoczęciem stosowania kremu z acyklowirem na opryszczkę powinni zasięgnąć porady lekarza. Lekarz może zalecić im przyjmowanie acyklowiru w postaci doustnej.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa