

Hevipoint, 50 mg/g, sztyft na skórę, 3 g



Cena: 24,00 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	sztyft
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hevipoint to lek o właściwościach przeciwwirusowych, przeznaczony do stosowania w przypadku nawrotów opryszczki wargowej wywołanej wirusem Herpes simplex.

Wskazania

Leczenie zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej (nawracająca opryszczka wargowa).

Działanie

Hevipoint zawiera w swoim składzie acyklowir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 5 razy dziennie nakładać sztyft, w odstępach ok. 4-godzinnych, z przerwą nocną. Na miejsce zakażone należy nakładać małą ilość leku.

Skład

- Substancją czynną jest: acyklowir (Aciclovirum).
- 1 g sztyftu zawiera 50 mg acyklowiru.
- Substancje pomocnicze: olej rycynowy pierwszego tłoczenia, tłuszcz stały, wosk carnauba, wosk biały, oktylododekanol, wazelina biała, butylohydroksytoluen, aromat waniliowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hevipoint:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- gdy występuje u pacjenta nadwrażliwość na walacyklowir,
- u osób poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- przemijające pieczenie, kłucie lub mrowienie w miejscu aplikacji,
- łuszczenie się skóry, łagodne wysuszenie skóry,
- świąd.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- rumień,
- kontaktowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje uczuleniowa, np. obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem w momencie wystąpienia reakcji alergicznej na lek, który może obejmować np. obrzęk twarzy.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: układ odpornościowy nie działa właściwie (np. po przeszczepie szpiku kostnego), opryszczka nie ustąpiła po 10 dniach, zmiany chorobowe nie zagoiły się lub nasiliły, wystąpiła ciężka nawrotowa opryszczka wargowa.
- Podczas stosowania należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, nosa, jamy ustnej.
- Lek nie jest przeznaczony do leczenia opryszczki narządów płciowych i zakażeń skórnych. Nie należy aplikować w wymienionych rejonach leku.
- Lek jest przeznaczony do stosowania w opryszczce zlokalizowanej na wargach.
- Podczas leczenia opryszczki nie należy dotykać miejsca zmienionego chorobowo aby uniknąć przenoszenia na zdrowe obszary skóry. Zmian opryszczkowych nie należy rozdrapywać, pęcherzyków przebijać.
- Lek zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscowe reakcje skórne, np. kontaktowe zapalenie skóry lub podrażnienie oczu lub błon śluzowych.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Leku nie należy przechowywać w lodówce.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek ważny jest 3 miesiące od pierwszego otwarcia.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów