

Heviran Comfort, 200 mg, tabletki, 25 tabletek

Cena: 35,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEVIRAN
Opakowanie	25 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Opryszczka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Heviran Comfort to przeciwwirusowy lek stosowany na nawroty opryszczki warg i twarzy, spowodowanej wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeznaczony dla dorosłych.

Działanie

Lek Heviran Comfort zawiera acyklowir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe, polegające na hamowaniu namnażania chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka (200 mg) 5 razy na dobę (co 4 godziny z zachowaniem przerwy nocnej).

Skład

- Substancją czynną leku jest acyklowir (Aciclovirum).
- 1 tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Heviran Comfort:

- jeśli pacjent jest uczulony na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- bóle głowy, zawroty głowy,
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
- świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło),
- zmęczenie,
- gorączka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

pokrzywka,

przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów - może być związane z wieloma chorobami i stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- duszność, obrzęk naczynioruchowy,
- reakcja anafilaktyczna (objawiająca się często świądem, pokrzywką, dusznością, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonym biciem serca),
- zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek),
- przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- pobudzenie, drżenie,
- zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja) i mowy,
- dezorientacja, omamy,
- objawy psychiatryczne,
- uszkodzenie mózgu (encefalopatia),
- drgawki, senność, śpiączka,
- zapalenie wątroby i żółtaczkę,
- ostra niewydolność nerek, ból nerek (zaburzenia czynności nerek zwykle ustępują szybko po uzupełnieniu płynów i/lub zmniejszeniu dawki albo odstawieniu leku),
- zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie - jeśli wystąpią siniaki, czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza,
- zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem Heviran Comfort należy skonsultować się z lekarzem albo farmaceutą, jeśli :

- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- pacjent stosuje inne leki, które mogą uszkodzić nerki,
- chory jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),
- pacjent posiada obniżoną odporność (np. po przeszczepie),
- chory cierpi na szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę wargową,
- pacjent zauważył, że opryszczka występuje częściej (powyżej 6 w ciągu roku) i trwa dłużej (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż

dotychczas nawroty, z bardziej

- nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia).

Producent

POLPHARMA S.A.
Pełplińska 19
Starogard Gdański



Heviran® comfort



**Dział "od wewnątrz" -
u źródła infekcji¹**



**Hamuje namnažanie vírusa
juž od 1 tabletki**



Przyspiesza gojenie nawet o 3 dni²



Postać w tabletkach nie wymaga dotykania opryszczonej



Mniejsze ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry lub na oko



Zwalcza wirusa już od 1. tabletki

2. Rabben-Dor et al. Oral acyclovir and herpes labialis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Am Dent Assoc.* 1987; 115(2):39-42.

★★★★★
4,7/5

1. Raborn GH et al. Oral acyclovir and herpes labialis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Am Dent Assoc* 1997; 115 (1): 30-42.

Zapobieganie nawrotom opryszczki



Heviran Comfort Max
Aciclovirum 400 mg x 30. tabletek

Wspomaganie gojenia
opryszczki



Heviran Comfort
Plastry na opryszkę
15 przezroczystych plastrów