

Heviran Comfort MAX, 400 mg, tabletki, 30 tabletek

Cena: 103,00 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEVIRAN
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Heviran Comfort Max to przeciwwirusowy lek w tabletkach stosowany na nawroty opryszczki warg i twarzy, spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeznaczony dla dorosłych.

Wskazania

Lek Heviran Comfort MAX stosuje się w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością. Lek Heviran Comfort MAX może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Działanie

Lek Heviran Comfort Max zawiera acyklowir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe, polegające na hamowaniu namnażania chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Dawkowanie

Dawkowanie Heviranu Comfort Max u osób dorosłych to 1 tabletka 2 razy dziennie, w 12-godzinnych odstępach czasu.

Skład

- Substancją czynną leku jest acyklowir (Aciclovirum).
- 1 tabletka zawiera 400 mg acyklowiru.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie stosować Heviranu Comfort Max u osób uczulonych na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło), zmęczenie, gorączka.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): pokrzywka, przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów - może być związane z wieloma chorobami i stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): duszność, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna (objawiająca się często świądem, pokrzywką, dusznością, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonym biciem serca), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek), przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): pobudzenie, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja) i mowy, dezorientacja, omamy, objawy psychiatryczne, uszkodzenie mózgu (encefalopatia), drgawki, senność, śpiączka, zapalenie wątroby i żółtaczka, ostra niewydolność nerek, ból nerek (zaburzenia czynności nerek zwykle ustępują szybko po uzupełnieniu płynów i/lub zmniejszeniu dawki albo odstawieniu leku), zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie - jeśli wystąpią siniaki, czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza, zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem Heviran Comfort należy skonsultować się z lekarzem albo farmaceutą, jeśli: u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, stosuje on inne leki, które mogą uszkodzić nerki, chory jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), pacjent posiada obniżoną odporność (np. po przeszczepie), chory cierpi na szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę wargową, pacjent zauważył, że opryszka występuje częściej (powyżej 6 w ciągu roku) i trwa dłużej (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawroty, z bardziej, zauważenia nasilonych objawów klinicznych (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia).
- Podczas stosowania leku zaleca się spożywanie dużej ilości płynów, co pomoże zapobiec uszkodzeniu nerek.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

Polpharma
Bobrowiecka 6
00-782 Warszawa

Galeria



Heviran® comfort MAX



Maksymalna dawka
acyklowiru bez recepty



Tylko 2 tabletki dziennie



Zmniejsza ryzyko nawrotu
opryszczki nawet o 73%¹

Heviran® comfort MAX



Postać w tabletkach nie wymaga
dotyknięcia opryszczki



Mniejsze ryzyko przeniesienia
wirusa na inne obszary skóry
lub na oko



Chroni przed nawrotem opryszczki

Poznaj inne produkty marki Heviran® Comfort

Leczenie nawrotowej
opryszczki warg i twarzy



Heviran Comfort
Aciclovirum 200 mg x 25 tabletek

Wspomaganie gojenia
opryszczki



Heviran Comfort
Plastry na opryszczkę
15 prześrodkowych plastrów

HEV-C/16/07-2022

1. Sprunova SL, et al. Acyclovir prevents reactivation of herpes simplex labialis in elderly. JAMA. 1990;263(15):2087-2089.