

# Hirudoid Żel 100 g

Cena: 51,34 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HIRUDOID
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Stłuczenie, Żyłaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Hirudoid** żel lek wskazany do stosowania miejscowego na urazy i krwiaki oraz zapalenie żył powierzchniowych. Zalecany do stosowania dla osób dorosłych.

### Wskazania

Tępe urazy z krwiakami lub bez nich, zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym, obrzęki, stłuczenia.

### Działanie

Preparat przyspiesza rozpuszczanie się już istniejących drobnych skrzepów krwi, a także znikanie siniaków oraz obrzęków i działa przeciwbólowo.

### Dawkowanie

Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm żelu.

Hirudoid w postaci żelu należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo. Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunek.

### Skład

100 g żelu zawiera: substancja czynna: polisarczan mukopolisacharydowy 0,3g/100g co odpowiada 25 000 j. oraz substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hirudoid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na mukopolisacharydowy polisarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko: mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

### Ostrzeżenia

- Lek Hirudoid zawiera glikol propylenowy. Lek może powodować podrażnienie skóry.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Producent

filSTADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel, Niemcy

## Galeria

