

Hitaxa Metmin-Spray, 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 140 dawek



Cena: 46,28 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HITAXA
Opakowanie	1 buteleczka po 140 dawek
Postać	Aerozol
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Hitaxa Metimin-Spray to lek łagodzący objawy zapalenia nosa, takie jak kichanie, świąd, uczucie zatkanego nosa i nadmierna ilość wydzieliny. Jest stosowany w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych, po diagnozie lekarza.

Wskazania

Produkt leczniczy Hitaxa Metmin-Spray wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych, które zostało potwierdzone diagnozą lekarską.

Działanie

Lek Hitaxa Metmin-Spray zawiera w składzie mometazonu furoinian, który ma działanie przeciwzapalne.

Dawkowanie

Podanie do nosa.

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny). Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić przez 2 krotne naciśnięcie pompki, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Skład

- Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.
- Każda dostarczana dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.
- Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, roztwór; glicerol, polisorb 80, celuloza mikrokryształiczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować aerozolu do nosa Hitaxa Metmin-Spray w przypadku nadwrażliwości na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje opryszczka, miał uraz lub zabieg chirurgiczny nosa.

Działania niepożądane

- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): ból głowy, kichanie i podrażnienie i (lub) pieczenie błony śluzowej nosa, krwawienie z nosa (występowało bardzo często (może wystąpić częściej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki mometazonu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę), ból nosa lub gardła, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia, uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza, zaburzenia smaku i węchu, trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech, nieostre widzenie.

Ostrzeżenia

- Hitaxa Metmin-Spray zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria

