

# Hydrocort 0,5% maść 5 mg/1g 20 g

Cena: 10,11 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 g
Postać	Maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Przeznaczenie	Alergia, Liszaj, Łojotokowe zapalenie skóry, Łuszczyca, Oparzenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

Hydrocort to produkt leczniczy o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne stosowanym m.in. po ukąszeniach, przy świądzie skóry.

### Wskazania

Ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry), łuszczyca skóry owłosionej, łuszczyca zadawniona, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, liszaj płaski o nasilonym świądzie, łojotokowe zapalenie skóry, wyprysk zliszajowaciasty, ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry, reakcja po ukąszeniach owadów, skórne odczyny polekowe, oparzenia I i II stopnia, neurodermatitis.

### Działanie

Przeciwzapalne, przeciwświądowe, obkurczające naczynia krwionośne.

### Dawkowanie

Na oczyszczoną skórę należy nakładać cienką warstwę maści, 2-3 razy na dobę. W przypadku poprawy częstość dawkowania zmienia się na 2-3 razy w tygodniu.

### Skład

1g maści zawiera: substancję czynną: hydrokortyzonu octan 5mg oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, glicerolu monostearnian, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hydrocort CHEMA:

- w przypadku uczulenia na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w zakażeniach skórnych pochodzenia wirusowego, grzybicze, bakteryjnego,

- w nowotworach skóry lub stanach przedrakowych,
- w zapaleniu skóry wokół ust,
- w trądziku różowatym lub pospolitym,
- na rany lub owrzodzenia,

#### Działania niepożądane

- Plamica,
- Pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość,
- Zanik skóry,

#### Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę - ryzyko ścieńczenia skóry, nadmiernej jej suchości.
- Podczas stosowanie leku należy chronić błony śluzowe i oczy.
- Stosowanie hydrokortyzonu na skórę pach, pachwin musi być uzasadnione - skóra w tych okolicach jest delikatniejsza i istnieje zwiększone ryzyko ogólnoustrojowego działania hydrokortyzonu (ze względu na możliwość wchłaniania),
- Hydrokortyzonu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym - możliwe nasilone wchłanianie leku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.