

Hydrocortisonum Aflofarm, 5 mg/g, krem, 15g

Cena: 12,88 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HYDROCORTISONUM
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, AZS (atopowe zapalenie skóry), Liszaj, Łojotokowe zapalenie skóry, Łuszczyca
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Hydrocortisonum Aflofarm to lek stosowany na AZS, liszaj, rumień i łuszcycę, posiadający właściwości przeciwświądowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Leczenie miejscowe w przypadku:

- atopowego zapalenia skóry (AZS),
- liszaja rumieniowatego, rumienia wielopostaciowego,
- łojotokowego zapalenia skóry,
- dolegliwości po ukąszeniach owadów,
- liszaja płaskiego o nasilonym świądzie,
- łuszczyny owłosionej skóry głowy, łuszczycy zadawnionej,
- oparzeń pierwszego i drugiego stopnia (także oparzenia słoneczne).

Działanie

Hydrocortisonum Aflofarm wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurzające naczynia krwionośne.

Skład

- Substancją czynną jest: hydrokortyzonu octan (Hydrocortisoni acetat).
- 1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.
- Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan, makroglu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona

Sposób użycia

Na zmienioną chorobowo skórę należy aplikować cienką warstwę kremu 2-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hydrocortisonum Aflofarm:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje grzybicze, wirusowe lub bakteryjne zapalenie skóry, także grzybica układowa,
- w trądziku różowatym i pospolitym,
- w zaniku (atrofii) skóry,
- w zapaleniu skóry wokół ust,
- na otwarte rany, uszkodzoną skórę,
- w nowotworze lub stanach przednowotworowych,
- w przypadku zmian gruczliczych skórę.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (przy stosowaniu dłużej niż 14 dni):

- rozstępy na skórze, zanikowe zapalenie skóry,
- nawrót zakażenia,
- plamica postteroidowa,
- trądzik, zapalenie skóry wokół ust i oczu,
- owrzodzenia, opóźnione gojenie się ran,
- wybroczyny (czerowono-fioletowe plamki na skórze),
- pieczenie, zaczerwienienie, alergja kontaktowa, suchość skóry,
- hiperglikemia, cukromocz,
- zespół Cushinga,
- jaskra / zaćma - przy stosowaniu leku na powieki.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku osób z cukrzycą, jaskrą/zaćmą, łuszczycą.
- Nie stosować leku na dużą powierzchnię ciała ani długotrwale - ryzyko uogólnionych działań niepożądanych.
- W przypadku np. nadkażenia bakteryjnego należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas stosowania należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi i oczami.
- Nie stosować opatrunku okluzyjnego na skórę posmarowaną kremem - ryzyko wzmożonego wchłaniania się hydrokortyzonu.
- Lek zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować podrażnienia skóry, w tym kontaktowe zapalenie skóry i reakcje alergiczne typu późnego.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Producent

Aflofarm

Galeria

