

Iberogast, płyn doustny, 20 ml



Cena: 35,15 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 ml
Postać	płyn doustny
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyoksydacyjne, Przeciwbakteryjne, Przeciwzapalne, Ułatwiające trawienie, Wiatropędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Iberogast to roślinny produkt leczniczy przeznaczony do łagodzenia różnych dolegliwości przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zespół jelita drażliwego, wzdęcia, nudności oraz zgaga.

Wskazania

- zaburzenia czynnościowe związane z motoryką przewodu pokarmowego (dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego),
- objawy towarzyszące powyższym zaburzeniom jak: dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit, ból brzucha, uczucie pełności, wzdęcia, nudności, zgaga.

Działanie

Iberogast wykazuje działanie wiatropędne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Dawkowanie

- Dzieci od 6 do 12 lat: 3 x dziennie po 15 kropli.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 x dziennie po 20 kropli.

Skład

Substancjami czynnymi są: wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego, wyciąg z korzenia arcydzięgla, wyciąg z kwiatu rumianku, wyciąg z owocu kminku, wyciąg z owocu ostropestu, wyciąg z liści melisy, wyciąg z liści mięty pieprzowej, wyciąg z ziela glistnika, wyciąg z korzenia lukrecji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Iberogast:



- w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników tego leku,
- u dzieci poniżej 6 lat (wyłącznie po konsultacji z lekarzem).

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości - wysypka, świąd, duszności.
- odwracalne uszkodzenie wątroby (ze względu na obecność glistnika).

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych chorób wątroby.
- Lek zawiera alkohol i nie powinien być stosowany w przypadku choroby alkoholowej.
- Stosowanie leku w przypadku dzieci z padaczką i chorobami wątroby powinno być omówione z lekarzem.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

BAYER SP. Z O.O./Inpharm
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa