


# Iberogast Płyn doustny 20 ml



Cena: 37,34 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	płyn doust.
Producent	BAYER SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

Iberogast® czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych, Lek Iberogast® można stosować u dzieci już od 6. roku życia!

### Wartości odżywcze

Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5)

ekstrahent - etanol

Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5)

Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4)

Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5)

Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5)

Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5)

Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5)

Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5)

Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5)

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30 % (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

100 ml płynu zawiera:

15,0 ml

50 % (v/v)

10,0 ml

20,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

5,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

### Stosowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku to:

• Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.

• Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie. Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem. Możliwa obecność osadu lub



zmętnienia nie wpływa na skuteczność leku.

**Przechowywanie**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

**Przeciwwskazania**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

Bayer Sp. z o.o.

**Zawartość opakowania**

20

**Opis**

Iberogast Płyn doustny 20 ml

## Galeria



Ten sam skład.  
 Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej  
 ilości wody lub soku



**100%**  
 składników  
 pochodzenia  
 naturalnego

Wybierz Iberogast®

Iberogast®  
 nie wchodzi  
 w interakcje\*  
 z innymi lekami,  
 a także wykazuje  
 niski odsetek  
 działań  
 niepożądanych.



Ostlinger B et al. STW Iberogast®  
 is safe and effective compared to the  
 treatment of functional gastrointestinal  
 disorders. Wien Med Wochenschr. 2011;  
 153(3-4): 65-72.

\* Interakcje dotychczas nie są znane

Sięgnij po Iberogast®,  
 1 lek na różne dolegliwości  
 trawienne\*



- Bóle i skurcze  
 brzucha
- Wzdęcia i gazy
- Uczucie pełności  
 i ciężkości
- Nudności
- Zgaga

\* w przypadku Zespołu Alfa Drażelnego (IBS) i Niestrawności Czynnościowej (Dyspepsji)

Iberogast®

Bez konserwantów, szucznych barwników	Bez cukru
Bez glutenu	Bez laktozy

Produkt  
 odpowiedni

dla  
**wegan**

9 ziół leczniczych,

które  
 współdziałając  
 łagodzą wiele  
 czynnościowych  
 dolegliwości  
 żołądkowo-  
 jelitowych



I problemy brzucha  
 z głowy **20 ml**