

Ibesan, 60 kapsułek

Cena: 77,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBESAN
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Adsorbujące (wiążące), Detoksykujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

IBESAN zapewnia ulgę przy bolesnych objawach oraz zawarteeniu w opisie pokarmowym. Łagodzi problemy związane z biegunką u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS). Normalizuje perystaltykę i ból, występują niedrożności jelit. Aktywne składniki to naturalna glina mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon, które nie są wchłaniane w torebkach. Naturalna glina mineralna absorbuje toksyny, bakterie i rotawirusy, które nakładają się na błony śluzowej jelit. Simetikon ułatwiający podłączenie pęcherzyków gazu w żołądku i kielbasach, co ułatwia ich pasaż przez jelita.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie.

Składniki

Naturalna glina mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, olej z nasion słonecznika.

Zastosowanie

- Nadmierne gromadzenie się gazów w układzie pokarmowym.
- Łagodzenie bólu brzucha w przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego.
- Normalizowanie perystaltyki i redukcja bólu, zapobiegając niedrożności jelit.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować równocześnie z innymi lekami.



Ostrzeżenia

Podczas stosowania wyrobu mogą wystąpić incydenty medyczne towarzyszące stosowaniu naturalnej glinki mineralnej: ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunka i uczucie pełności.

Ważne wskazówki

- Pomimo tego, że ani naturalna glinka mineralna ani simetikon nie są wchłaniane w przewodzie pokarmowym, bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży nie zostało właściwie ocenione. Brak kontrolowanych danych dotyczących wpływu na ciążę lub przenikanie do mleka kobiecego. Zaleca się, aby kobiety w ciąży lub karmiące piersią skonsultowały się z lekarzem przed zastosowaniem tego preparatu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 5-25 stopni C w suchym, ciemnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Producent

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL