

Ibupast Forte, 400 mg, 20 tabletek powlekanych



Cena: 14,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Ibupast Forte to preparat zawierający 400 mg ibuprofenu, należącego do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Stosowanie

Zalecana dawka to 400 mg ibuprofenu (1 tabletkę) do 3 razy na dobę w odstępach co 4 - 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg ibuprofenu (3 tabletki) na dobę.

Przeznaczenie

Lek jest przeznaczony do stosowania w krótkotrwałym objawowym leczeniu:

- bólów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takich jak: bóle reumatyczne i mięśniowe, bóle pleców, nerwobóle, pierwotne bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, migrena, bóle głowy,
- objawów grypy i przeziębienia,
- gorączki trwającej krócej niż 3 dni.

Przeciwwskazania

Leku IBUPAST Forte nie należy stosować:

- astmy, pokrzywki lub reakcji typu alergicznego po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
- zwiększonej skłonności do krwawień lub czynnych krwawień,
- krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
- wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodu trawiennego lub nawracającego krwawienia z przewodu pokarmowego (zdefiniowanego jako dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
- ciężkiej niewydolności serca, nerek i wątroby,
- wrodzonych zaburzeń metabolizmu porfiryny (np. ostrej porfirii przerywanej),

- przewlekłego alkoholizmu (14 do 20 drinków tygodniowo lub więcej),
- zaburzeń produkcji krwinek o nieznanej etiologii.

Ostrzeżenia

Lek IBUFAST Forte nie powinien być stosowany w następujących sytuacjach, chyba że lekarz wyraźnie to zaleci:

- przy niekontrolowanym nadciśnieniu tętniczym,
- przy zastoinowej niewydolności serca,
- przy rozpoznanej chorobie niedokrwiennej serca,
- przy chorobie tętnic obwodowych i (lub) chorobie naczyń mózgowych,
- przy znacznym odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niedostatecznym spożyciem płynów),
- przy toczniu rumieniowatym układowym lub innych chorobach autoimmunologicznych,
- u dzieci.

Producent

FORTIS PHARMACEUTICA