

Ibufen Baby, 125 mg, czopki, 5 czopków

Cena: 18,99 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUFEN
Opakowanie	5 czopków
Postać	Czopek
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Ibufen Baby to lek w postaci czopków przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 2. roku życia. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), którego substancja czynna, czyli ibuprofen, posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Lek jest zalecany w przypadku łagodnych do umiarkowanych bólów, takich jak bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów (również związane z ząbkowaniem), bóle wynikające z urazów narządu ruchu, a także ból ucha występujący w stanach zapalnych ucha środkowego.

Wskazania

Lek przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 2. roku życia w przypadku:

- gorączki różnego pochodzenia, w tym w przebiegu zakażeń wirusowych oraz odczynu poszczepiennego,
- bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym ból głowy, gardła i mięśni towarzyszących przeziębieniu i grypie,
- bólu mięśni, stawów, kości, w tym na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia),
- ból na skutek urazów tkanek miękkich, w tym bóle pooperacyjne,
- ból zębów, w tym spowodowany ząbkowaniem,
- ból głowy,
- ból uszu w stanach zapalnych ucha środkowego.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 2-4 lata (od 12,5 do 17 kg): 1 czopek (125 mg) do 3 razy na dobę w odstępach co 6-8 godzin (nie stosować więcej niż 3 czopki/dobę).
- Dzieci w wieku 4-6 lat (od 17 do 20,5 kg): 1 czopek (125 mg) do 4 razy na dobę w odstępach co 6 godzin (nie stosować więcej niż 4 czopki/dobę).

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 125 mg,
- pozostałe składniki: Witepsol H 15, Witepsol W 45.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, którykolwiek z pozostałych składników leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub gdy po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego albo innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej.

Nie zaleca się podawania leku Ibufen Baby jeśli pacjent choruje na ospę wietrzną oraz jeśli przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2, gdyż większa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane

- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha i nudności oraz miejscowe podrażnienie odbytu, bóle głowy, wysypki skórne różnego typu lub pokrzywka i świąd.
- Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, wymioty.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli stwierdzono u niego tocznię rumieniowatą, mieszaną chorobę tkanki łącznej, choroby odbytu i odbytnicy, choroby układu pokarmowego, przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna), cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, dławicę piersiową, chorobę tętnic obwodowych, zaburzenia czynności nerek i wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi, czynną/przebytą astmę oskrzelową, objawy reakcji alergicznych w przeszłości lub jeśli w przeszłości przeżył atak serca, udar, operację pomostowania oraz jeśli pali tytoń.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia albo perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały.

Producent

Farmina Sp. z o.o
Cegielskiego 2
32-400 Myślenice

Galeria





APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943