

Ibufen Baby 60 mg, 5 czopków

Cena: 11,23 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUFEN
Opakowanie	5 czopków
Postać	Czopek
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Ibufen Baby jest przyporządkowany do kategorii niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Preparat posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach:

- Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego).
- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
- bóle głowy, gardła i mięśni towarzyszące przeziębieniu i grypie,
- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia),
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne,
- bóle zębów, w tym bóle na skutek ząbkowania,
- bóle głowy,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Niemowlęta od 3 do 9 miesięcy (od 6 do 8 kg): 1 czopek 60 mg; 3 razy na dobę, w odstępach co 6 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby.

- Niemowlęta i małe dzieci od 9 miesięcy do 2 lat (od 8 do 12 kg): 1 czopek 60 mg; 4 razy na dobę, w odstępach co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: 60 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: Witepsol H 15, Witepsol W 45.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ibufen Baby:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),
- jeśli pacjent ma skazę krwotoczną,

Działania niepożądane

- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha i nudności oraz miejscowe podrażnienie odbytu, bóle głowy, wysypki skórne różnego typu lub pokrzywka i świąd.
- Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, wymioty.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując Ibufen Baby u pacjentów z chorobami tkanki łącznej, stosujących inne NLPZ, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, z zaburzeniami czynności wątroby.
- Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.
- Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u pacjentów z ospą wietrzną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pielplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

