

Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, (200mg/5ml), zawiesina doustna, 100 ml



Cena: 40,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUFEN
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Zawiesina
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwogorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Ibufen dla dzieci Forte w smaku truskawkowym to doustna zawiesina lecznicza, w której substancją czynną jest ibuprofen. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Preparat Ibufen może być stosowany u dzieci powyżej 3. miesiąca życia, młodzieży i dorosłych w przypadku gorączki o różnym pochodzeniu oraz w przypadku bólów o charakterze słabym do umiarkowanego.

Wskazania

- Gorączka różnego pochodzenia, także w przebiegu zakażeń wirusowych.
- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, również bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- dzieci o masie ciała 5-7,6 kg (wiek 3-6 miesięcy): jednorazowa dawka 1,25 ml (50 mg) maksymalnie do 3 razy na dobę (150 mg),
- dzieci o masie ciała 7,7-9 kg (wiek 6-12 miesięcy): jednorazowa dawka 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3-4 razy na dobę (150-200 mg),
- dzieci o masie ciała 10-15 kg (wiek 1-3 lat): jednorazowa dawka 2,5 ml (100 mg) maksymalnie 3 razy na dobę (300 mg),

- dzieci o masie ciała 16-20 kg (wiek 4-6 lat): jednorazowa dawka 3,75 ml (150 mg) maksymalnie 3 razy na dobę (450 mg),
- dzieci o masie ciała 21-29 kg (wiek 7-9 lat): jednorazowa dawka 5 ml (200 mg) maksymalnie 3 razy na dobę (600 mg),
- dzieci o masie ciała 30-40 kg (wiek 10-12 lat): jednorazowa dawka 7,5 ml (300 mg) maksymalnie 3 razy na dobę (900 mg),
- dzieci o masie ciała powyżej 40 kg (wiek powyżej 12 lat), młodzież i dorośli: jednorazowa dawka 5-10 ml (200-400 mg mg) maksymalnie 3 razy na dobę (600-1200 mg),

Skład

5 ml zawiesiny zawiera:

- substancję czynną: 200 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: hypromeloza, guma ksantan, glicerol (E422), sodu benzoatan (E211), maltitol ciekły (E965), sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E954), sodu chlorek, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - ibuprofen, inne leki z grupy NLPZ lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego,
- jeśli wystąpiły w przeszłości alergiczne objawy w postaci kataru (nieżyty błony śluzowej nosa), obrzęk naczyniorychowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli,
- astma oskrzelowa po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ,
- w przypadku istniejącego lub gdy występowało owrzodzenia żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
- w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, nerek, serca,
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego (np. trombocytopenia),
- w przypadku ciężkiego odwodnienia,
- u kobiet w III trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży),
- u dzieci poniżej 5 kg masy ciała.

Działania niepożądane

- Często: biegunka (ze względu na obecność maltitolu i glicerolu w składzie leku).
- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, wzdęcia, bóle głowy, wysypki skórne różnego typu, pokrzywka i świąd.
- Rzadko: wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia i wymioty, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występujących: chorób serca (niewydolność serca, dławica piersiowa), nadciśnienia tętniczego, chorób przewodu pokarmowego, niewydolności nerek i/lub wątroby, zaburzeń krzepnięcia krwi, ospy wietrznej.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym.
- W przypadku łącznego stosowania leków przeciwzakrzepowych, moczopędnych, nasercowych, kortykosteroidów, stosowanie leku Ibufen omówić z lekarzem.
- Długotrwałe stosowanie ibuprofenu jak i innych leków z grupy NLPZ może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia nerek (szczególnie gdy towarzyszy obciążenie fizyczne i odwodnienie).
- U dzieci odwodnionych istnieje ryzyko zaburzeń czynności nerek przy łącznym stosowaniu ibuprofenu.
- Należy unikać stosowania ibuprofenu podczas trwającej ospy wietrznej.
- Lek zawiera maltitol ciekły - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek zawiera sód (9,44 mg w 5 ml) - należy to uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek oraz u pacjentów kontrolujących ilość sodu w diecie.
- Lek po pierwszym otwarciu może być używany przez 6 miesięcy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie należy przechowywać leku w temperaturze wyższej niż 25°C.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Galeria

