

## Ibum Express Forte 400 mg, 36 kapsułek miękkich

Cena: 38,10 zł



### Opis słownikowy

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                              |
| Marka           | IBUM                                                               |
| Opakowanie      | 36 kapsułek                                                        |
| Postać          | Kapsułka miękka                                                    |
| Producent       | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.                   |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne                  |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                                    |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat |

### Opis produktu

#### Opis

**Ibum Express Forte** to lek w postaci kapsułek miękkich, pochodzących z 400 mg ibuprofenu, należącego do grupy niesteroidowych rozwiązań zwalczających (NLPZ). Ibuprofen ma charakter przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Dzięki płynnej postaci ibuprofenu w kapsułkach miękkich, lek szybko się wchłania i szybko zaczyna działać po podaniu.

#### Wskazania

Lek Ibum Express Forte stosuje się u dorosłych i młodzieży po 12 roku życia w poniższych przypadkach:

- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie.
- Bolesne miesiączkowanie.
- Stany gorączkowe różnego pochodzenia, w tym w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

#### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

#### Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa to 1 kapsułka (400 mg), w razie konieczności co 4 do 6 godzin.

#### Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 400 mg,

- substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E 131).

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, perforacja (przeziurawienie) lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ.
- Wystąpienie w przeszłości objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
- Przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorykoksyb).
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
- Krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie.
- Zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

#### Działania niepożądane

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
- bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
- zaburzenia widzenia,
- wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
- owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust,
- reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
- ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona; w wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna),
- zmniejszone oddawanie moczu oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny); uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika

we krwi (pierwszymi objawami są zmniejszone oddawanie moczu, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie),

- problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki),
- reakcje psychiatryczne i depresja,
- pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia; jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się w trakcie stosowania leku Ibum Express Forte, należy skonsultować się z lekarzem,
- obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca,

#### Ostrzeżenia

- Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, serca, nadciśnieniem, astmą, cukrzycą powinni skonsultować stosowanie leku z lekarzem.
- Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek u odwodnionych pacjentów.
- Ibum Express Forte może maskować objawy istniejącego zakażenia lub gorączki.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

- Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku Ibum Express Forte.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze powyżej 25°C.

**Producent**

HASCO-LEK  
Żmigrodzka 242e  
Wrocław