

Ibum forte, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna o smaku malinowym, 100 g

Cena: 24,23 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	130 g
Postać	Syrop
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Ibum Forte to lek w formie syropu, który wykazuje działanie łagodzące ból, obniżające gorączkę oraz redukujące stany zapalne. Dostępny w przyjemnym, malinowym smaku.

Wskazania

Lek Ibum Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

- gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego.
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

Działanie

Lek Ibum Forte łagodzi dolegliwości bólowe i gorączkowe.

Dawkowanie

- Dzieci 3-6 miesięcy: 2,5ml,
- Dzieci 6-12 miesięcy: 2,5 ml,
- Dzieci 1-3 lat: 5ml,
- Dzieci 4-6 lat: 7,5ml,
- Dzieci 7-9 lat: 10ml,
- Dzieci 10-12 lat: 15-20 ml.

Skład

- Substancją czynną leku jest: ibuprofen.
- 5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoosan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibum forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,

- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości

jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,

- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

- zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
- bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
- zaburzenia widzenia,
- wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
- owrzodzenie jamy ustnej lub obrzęk i podrażnienie ust,
- reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10000):

- szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjenta na 10000):

- zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
- ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęchrze,
- zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle,
- problemy dotyczące wytwarzania krwinek,
- reakcje psychiatryczne i depresja,
- zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby.

Ostrzeżenia

- Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ,
- Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe,
- Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy,
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO -- Lek S. A.
Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław