

# Ibum forte, 400 mg, kapsułki miękkie, 24 kapsułki

Cena: 122,09 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                         |
| Opakowanie      | 24 kapsułki                                      |
| Postać          | Kapsułki                                         |
| Producent       | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                  |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów       |

## Opis produktu

### Opis

**Ibum Forte** to środek farmaceutyczny wykazujący działanie łagodzące ból, obniżające gorączkę oraz redukujące stany zapalne.

### Wskazania

Wskazaniami do stosowania leku są:

1. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:

- bóle głowy (w tym także migreny)
- bóle zębów
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne
- bóle po urazach
- nerwobóle
- bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie.

2. Bolesne miesiączkowanie.

3. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

### Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa 400 mg (1 kapsułka), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych.

### Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen.
- 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo

odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa (E104), błękit patentowy (E131).

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibum Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ;
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej;
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca;
- u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);
- u pacjentów ze skazą krwotoczną (skłonnością do krwawień).

#### Działania niepożądane

- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd.
- Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.
- Bardzo rzadko: smółowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, oliguria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

#### Ostrzeżenia

- Lek Ibum Forte zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek Ibum Forte zawiera żółcień chinolinową (E104) i błękit patentowy (E131) - lek może powodować reakcje alergiczne.

#### Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO -- Lek S. A.  
Żmigrodzka 242e  
51-131 Wrocław