

Ibum Forte zawiesina 100 g Truskawka



Cena: 31,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUM
Opakowanie	100 g (but.)
Postać	Zawiesina
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Opis
Ibum Forte to produkt leczniczy w postaci syropu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

Wskazania
Lek Ibum Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

- gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczeniennego.
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg): 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg): 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3-4 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 1-3 lat (10-15 kg): 2,5 ml (100 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg): 3,75 ml (150 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg): 5 ml (200 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml (300 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 40 kg: 7,5 -10 ml (300-400 mg) maksymalnie 3-4 razy po 7,5 ml na dobę.

Skład

5 ml zawiesiny Ibum Forte zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 200 mg
- substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma, ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoosan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat bananowy, woda oczys

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibum forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości
- jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Działania niepożądane

- Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.
- Niezbyt często : zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit), bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).
- Rzadko: szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Ostrzeżenia

- Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ,
- Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwplatekcyjne,
- Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy,
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław