

Ibupar, 200 mg, tabletki drażowane, 10 tabletek

Cena: 5,65 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwpalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ibupar to lek stosowany na bóle głowy, zębów, mięśni, stawów oraz w przypadku gorączki, na przykład w przeziębieniu.

Wskazania

Ibupar wskazany jest do stosowanie w bólu o słabym do umiarkowanego nasileniu:

- ból głowy (również migrenowy), bóle zębów, mięśni i stawów,
- ból pourazowy, nerwobóle,
- bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie,
- gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przeziębieniu i grypie),
- bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Ibupar wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa wynosi 1-2 tabletki (200-400 mg) jednorazowo lub 1-2 tabletki co 4-6 godzin.

Skład

- Substancją czynną jest: ibuprofen.
- 1 tabletka drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon 25, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk; otoczka: sacharoza, talk, guma arabska (suszona rozpyłowo), czerwień koszenilowa (E 124), work Carnauba, воск biały.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibupar:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku,
- w przypadku zdiagnozowanej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy,
- w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, wątroby, serca,

jeśli w przeszłości występowały objawy alergii, pokrzywki, astmy oskrzelowej po zażyciu leków z grupy NLPZ,

- w przypadku III trymestru ciąży,
- w przypadku stosowania innych NLPZ,
- w przypadku skazy krwotocznej.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- wysypki,
- obrzęki,
- zmniejszenie łaknienia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- niestrawność, nudności, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, zgaga, dyskomfort w nadbrzuszu,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- mroczki, niewyraźne widzenie, ból głowy,
- świąd, pokrzywka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zawroty głowy, bezsenność / senność,
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie
- błony śluzowej żołądka,
- uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- smoliste stolce, krwiste wymioty, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,
- szumy uszne, zaburzenia słuchu,
- zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia w obrazie krwi (eozynofilia, leukopenia, neutropenia), małopłytkowość,
- reakcje bronchoplastyczne, zaostrzanie astmy.

Ostrzeżenia

- Ibupar zawiera czerwień koszenilową (E 124) - może powodować reakcje alergiczne.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę - nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów.
- Nie stosować leku w przypadku wystąpienia objawów wysypki skórnej, objawów nadwrażliwości.
- Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w wieku podeszłym powinny zachować ostrożność podczas stosowania leku.
- W przypadku stosowania glikokortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol), leków przeciwplatek (np. kwas acetylosalicylowy) razem z Ibuparem może dojść do zwiększenia ryzyka zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia.
- U osób w wieku podeszłym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- U pacjentów z astmą i chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Należy zachować ostrożność ze względu na działanie przeciwzakrzepowe ibuprofenu, szczególnie w połączeniu z innymi lekami o takim działaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria

