

Ibupar forte, 400 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 11,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUPAR
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ibupar Forte to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy stosowany przy bólach głowy, zębów, stawów, nerwobólach, przeziębieniu, gorączce i bolesnym miesiączkowaniu.

Wskazania

- Bóle słabe do umiarkowanego - ból głowy w tym bóle migrenowe, bóle zębów, mięśni i stawów, ból pourazowy, nerwoból, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie,
- Gorączka różnego pochodzenia, np. towarzysząca grypie i przeziębieniu,
- Bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Ibupar forte wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka (400 mg) jednorazowo. Kolejną dawkę można przyjąć w miarę potrzeby co 4-6 godzin.

Skład

- Substancją czynną jest: ibuprofen.
- 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (101), skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumarany; otoczka: makrogol (4000), hypromeloza (E 5), hypromeloza (E 15), hydroksypropyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110) lak, czerwień koszenilowa (E

124)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibupar forte:

- w przypadku uczulenia na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pozostałych leku,
- jeśli pacjent ma czynną lub występującą w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforację lub krwawienie,
- w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności serca,
- w przypadku objawów alergii, pokrzywki, astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ,
- III trymestr ciąży,
- w przypadku stosowania innych leków z grupy NLPZ,
- w przypadku skazy krwotocznej.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- wysypki,
- zmniejszenie łaknienia,
- obrzęki.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, zgaga, dyskomfort w nadbrzuszu,
- mroczki, niewyraźne widzenie, ból głowy,
- świąd, pokrzywka,
- nudności,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zawroty głowy, bezsenność / senność,
- uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- smoliste stolce, krwiste wymioty, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,
- szumy uszne, zaburzenia słuchu,
- zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia w obrazie krwi (eozynofilia, leukopenia, neutropenia), małopłytkowość,
- reakcje bronchoplastyczne, zaostrzanie astmy.

Ostrzeżenia

- Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w wieku podeszłym powinny zachować ostrożność podczas stosowania leku.
- U osób w wieku podeszłym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- W przypadku stosowania glikokortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol), leków przeciwplatek (np. kwas acetylosalicylowy) razem z Ibuparem może dojść do zwiększenia ryzyka zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia.
- Nie stosować leku w przypadku wystąpienia objawów wysypki skórnej, objawów nadwrażliwości.
- U pacjentów z astmą i chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Ibuprofen może powodować zaburzenia widzenia.
- Należy zachować ostrożność ze względu na działanie przeciwzakrzepowe ibuprofenu, szczególnie w połączeniu z innymi lekami o takim działaniu.
- Ibupar forte zawiera żółcień pomarańczową (E 110) lak, czerwien koszenilową (E 124) - mogą powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria

