

Ibuprofen 400 mg Lek przeciwbólowy przeciwgorączkowy i przeciwzapalny 20 sztuk

Cena: 7,17 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 20 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie | Ból, Gorączka, Stan zapalny |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat |

Opis produktu

Opis

Ibuprofen Aflofarm to lek w formie tabletek drażowanych, który działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Jego substancją czynną jest ibuprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Każda tabletkę zawiera 400 mg ibuprofenu. Lek ten stosuje się w celu doraźnego łagodzenia różnego rodzaju bólu o nasileniu od słabego do umiarkowanego. Jest skuteczny w przypadku bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu mięśniowego, bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólu kostno-stawowego, nerwobólów oraz bolesnego miesiączkowania. Dodatkowo, Ibuprofen Aflofarm może być również stosowany w celu obniżenia gorączki, która występuje m.in. w przebiegu grypy lub przeziębienia. Lek przeznaczony jest do doraźnego stosowania u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia.

Wskazania

- Bóle o umiarkowanym lub słabym nasileniu (ból zębów, bóle stawów, bóle mięśni, bolesne miesiączkowanie, bóle głowy, w tym bóle migrenowe, bóle menstruacyjne).
- Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny po posiłkach.
Tabletkę należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 400 mg,
- pozostałe składniki: hypromeloza, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, guma arabska, sacharoza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), mieszanina białego wosku pszczelego i wosku Carnauba (Capol 1295).

Przeciwwskazania

Lek Ibuprofen Aflofarm nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, a także na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Dodatkowo, nie zaleca się jego stosowania u osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały objawy alergii, takie jak katar, pokrzywka lub astma oskrzelowa.

Ibuprofen Aflofarm również nie jest wskazany dla osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, a także z perforacją lub krwawieniem, w tym tych, które wystąpiły po zastosowaniu innych NLPZ. Lek nie powinien być stosowany u osób z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.

Dodatkowo, nie zaleca się stosowania Ibuprofenu Aflofarm u osób przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

Działania niepożądane

- ból brzucha, nudności, niestrawność (uczucie gniecienia w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga, zaparcia),
- bóle głowy, mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego,
- pokrzywka, świąd.
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie lub pobudzenie, drażliwość,
- obrzęki.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Ibuprofen Aflofarm może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprofen Aflofarm, a pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków.

Ostrzeżenia

przed zastosowaniem leku Ibuprofen Aflofarm należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują jakiegokolwiek istotne schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, wątroby, krzepnięcia krwi, choroby układu pokarmowego, a także jeśli wystąpiła wcześniejsza reakcja alergiczna na kwas acetylosalicylowy (ASA) lub jeśli pacjent ma aktywną lub przebytą astmę oskrzelową.

W przypadku przyjmowania innych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, czy sterydy, również zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed zastosowaniem leku Ibuprofen Aflofarm.

Długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych, w tym ibuprofenu, może zwiększać ryzyko wystąpienia nefropatii postanalgetycznej, czyli uszkodzenia nerek.

U dzieci odwodnionych, zwłaszcza podczas stosowania ibuprofenu, istnieje większe ryzyko uszkodzenia nerek, dlatego w przypadku takich przypadków również zaleca się konsultację z lekarzem przed podaniem leku.

Warto również zauważyć, że Ibuprofen Aflofarm zawiera sacharozę, więc pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

