

Ibuprofen APTEO MED, 200 mg, 60 tabletek powlekanych

Cena: 19,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ibuprofen APTEO MED zawiera ibuprofen, który jest częścią grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) używanych do łagodzenia bólu i obniżania gorączki.

Lek ten jest wykorzystywany do krótkotrwałego leczenia objawowego umiarkowanego i łagodnego bólu, takiego jak ból głowy, menstruacyjny, zębów, a także w przypadkach gorączki.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, ból miesiączkowy, ból zębów oraz gorączka.

Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

- Należy przyjmować 1 tabletkę (200 mg do 400 mg ibuprofenu), popijając szklanką wody, maksymalnie do 3 razy na dobę, w razie konieczności.
- Nie przyjmować częściej niż co 6 godzin.
- Nie przyjmować więcej niż 1200 mg ibuprofenu na dobę.
- Tabletki są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Skład

- Substancją czynną leku Ibuprofen APTEO MED jest ibuprofen. Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki leku:

- Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza



mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian

- Otoczka tabletki: Opadry White 03G28692: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, makrogol 400

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli u pacjenta wystąpiły trudności w oddychaniu, astma, katar, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych

podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ),

- Jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka (lub kiedykolwiek wystąpiły dwa lub więcej przypadki choroby wrzodowej) lub krwawienie z żołądka,
- Jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ,
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, serca lub wątroby,
- Jeśli u pacjenta występują krwawienia, w tym krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych),
- Jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- U pacjentów ze znacznym odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
- U pacjentek w ostatnim trymestrze ciąży.

Producent

SYNOPTIS PHARMA