

Ibuprom Max Rapid, 400 mg, tabletki powlekane, 24 tabletki

Cena: 30,83 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ibuprom Max Rapid to lek stosowany w celu objawowego, krótkotrwałego łagodzenia bólu. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Wskazania

Ibuprom Max Rapid stosuje się w ostrych bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny); bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bóle po urazach; nerwobóle; bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; bolesne miesiączkowanie, a także w stanach gorączkowych różnego pochodzenia (np. w przebiegu grypy, przeziębienia).

Działanie

Ibuprofen należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Wykazuje także zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co cztery godziny. Tabletki popijać wodą. Nie stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (200M); sodu laurylosiarczan; krospowidon; powidon (K-30); krzemionka, koloidalna uwodniona; laktoza jednowodna; talk; magnezu stearynian. Otoczek (Opadry fx 64F580006): hypromeloza 2910; laktoza jednowodna; makrogol (E1521); potasowo-glinowy krzemian (E 555) / tytanu dwutlenek (E 171); talk; tytanu dwutlenek (E171); sodu cytrynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent: ma nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; kiedykolwiek miał reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa)

po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ma perforację lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ma ciężką niewydolność wątroby; ciężką niewydolność nerek lub ciężką niewydolność serca (klasa IV wg NYHA); jest w ostatnim trymestrze ciąży; ma skazę krwotoczną.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle głowy, pokrzywka, różnego rodzaju wysypki skórne i świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zaburzenia psychiczne, depresja, szumy uszne; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna; zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu); zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania; zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów, małopłytkowość – zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwice oddzielanie się naskórka; obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność; tachykardia – przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie – nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs; aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.
- Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych): nadreaktywność dróg oddechowych, w tym astma; mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofiliów (rodzaj białych krwinek); czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowie i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku IBUPROM MAX RAPID i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Skóra staje się wrażliwa na światło.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej; ma objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego; ma choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna); ma nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca; ma zaburzenia czynności nerek; ma zaburzenia czynności wątroby; ma zaburzenia krzepnięcia krwi; ma czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli; ma choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy); musi ograniczać spożycie sodu w diecie.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław