

Ibuprom Max Sprint, 400 mg, kapsułki miękkie, 40 kapsułek

Cena: 46,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	40 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ibuprom Max Sprint to lek w miękkich kapsułkach zawierający ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Stosowany na bóle różnego pochodzenia od słabych do umiarkowanych: bóle głowy (np. napięciowy ból głowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, kostne i stawowe. Można go stosować także na bóle menstruacyjne oraz gorączkę, np. w przeziębieniu czy grypie. Przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Wskazania

Lek Ibuprom Max Sprint stosuje się w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w gorączce: bóle głowy (m.in. ból napięciowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe, bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Lek Ibuprom Max Sprint działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Dawkowanie Ibupromu Max Sprint dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to 1 kapsułka co 4 godziny po posiłkach. Maksymalna dawka dobową to 3 kapsułki.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)
- 1 tabletkę leku zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować Ibuproemu Max Sprint u osób z nadwrażliwością na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie podawać leku pacjentom, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych), ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, skaza krwotoczna.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): niestrawność, ból brzucha, nudności; ból głowy; pokrzywka, świąd.
- Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia; obrzęki.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się m.in. smolistymi stolcami, krwawymi wymiotami), perforacja, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; depresja, reakcje psychiatryczne; szumy uszne; jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u osób z chorobami autoimmunologicznymi: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej); zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek), martwica brodawek nerkowych; zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; nieprawidłowości morfologii krwi (anemia – niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby leukocytów, trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów i trombocytów, agranulocytoza – obniżenie liczby granulocytów); pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica (pojawienie się drobnych, czerwonych kropek i grudek na skórze), krwawienie z nosa); ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, przyspieszenie rytmu serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek ciśnienia krwi z towarzyszącym pobladnięciem, utratą przytomności, potami); zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; nadciśnienie tętnicze.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol i potas, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera 1,14 mmol (44,82 mg) potasu na dawkę, co należy uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław