

Ibuprom Max Sprint Kapsułki miękkie 20 kapsułek

Cena: 22,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUPROM
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis
Ibuprom Max Sprint to szybko działający produkt leczniczy o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Wskazania
Lek Ibuprom Max Sprint stosuje się w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w gorączce:

bóle głowy (m.in. ból napięciowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe, bolesne miesiączkowanie.

Działanie
Lek Ibuprom Max Sprint działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- doustnie 1 kapsułka co 4 godziny po posiłkach.
- Kapsułkę należy popić płynem.
- Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę.
- Nie należy rozgryzać kapsułek.
- Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.



Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)

1 tabletkę leku zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Wymienione przeciwwskazania dotyczą osób, które wykazują nadwrażliwość na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub substancje pomocnicze użyte w produkcie. Dodatkowo, osoby, które miały objawy alergii po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (np. katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) nie powinny stosować ibuprofenu.

Osoby, które mają historię choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (czynnej lub przebytej), krwawienia lub perforacji związanych z wcześniejszym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, również nie powinny stosować ibuprofenu.

Ponadto, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca stanowią kolejne przeciwwskazania do stosowania tego leku. Osoby z skazą krwotoczną również powinny unikać stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ibuprofenu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

Lek zawiera sorbitol i potas.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,14 mmol (44,82 mg) potasu na dawkę, co należy uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.