

Ibuprom Sprint Caps 200 mg, 10 kapsułek

Cena: 14,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUM
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ibuprom Sprint to lek w postaci miękkich kapsułek o dawce 200 mg, który wykazuje działanie przeciwbólowe. Pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych będących jedną z przyczyn bólu oraz skutecznie obniża gorączkę.

Wskazania

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, bolesne miesiączkowanie, gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Działanie

Substancją czynną leku jest ibuprofen, który należy do grupy leków NLPZ. Łagodzi uczucie bólu i objawy gorączki.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 do 2 kapsułek doustnie co 4 godziny po posiłkach.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen 200 mg.

Substancje pomocnicze to:

- Skład rdzenia kapsułki: Makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona,
- Skład otoczki kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, błękit patentowy V (E 131).

Stosowanie

Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek:

- jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- jeśli występują objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,
- jeśli u pacjenta stwierdzono choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi,
- jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy).

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50 - 507 Wrocław

Galeria

