

# Ibuprom Tabletki powlekane 96 tabletek

Cena: 62,46 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUPROM
Opakowanie	96 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

Produkt leczniczy **Ibuprom** stosuje się w bólach głowy, zębów, mięśni, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, kości i stawów, w bolesnym miesiączkowaniu oraz w gorączce.

### Wskazania

Lek Ibuprom jest wskazany do krótkotrwałego stosowania przy dolegliwościach bólowych różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, bóle miesiączkowe. przy gorączce (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

### Działanie

Lek Ibuprom działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

### Dawkowanie

- Dzieci od 6 do 9 lat (masa ciała 20 - 29 kg): doustnie 1 tabletkę co 6 - 8 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę.
- Dzieci od 10 do 12 lat (masa ciała 30 - 39 kg): doustnie 1 tabletkę co 6 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę.

### Skład

1 tabletkę powlekana zawiera: 200 mg ibuprofenu.



Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony; Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina sacharozy i skrobi kukurydzianej), węglan wapnia, guma akacjowa, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik biały - Opalux White AS 7000, wosk Carnauba, tusz czarny - Opacode Black S-1-17823.

#### **Przechowywanie**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Ostrzeżenia**

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej, objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego, choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna), nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi, czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.