

Ibuprom Zatoki Tabs, 200 mg+6,1 mg, tabletki drażowane, 24 tabletki

Cena: 41,31 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ibuprom Zatoki Tabs to lek dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych, stosowany do krótkotrwałego łagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból, gorączka oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych.

Wskazania

Lek Ibuprom Zatoki Tabs wskazany jest do doraźnego stosowania w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Działanie

Lek Ibuprom Zatoki Tabs działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo (ibuprofen), udrożnia nos i zatoki oboczne nosa (fenylefryna).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę (co 8 godzin). Należy zachować co najmniej 4 godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (Ibuprofenum) i fenylefryny chlorowodorek (Phenylephryni hydrochloridum).
- Jedna tabletki drażowana zawiera: 200 mg ibuprofenu i 6,1 mg chlorowodoru fenylefryny.
- Substancje pomocnicze: Rdzeń: wapnia wodorofosforan dwuwodny, kroscarmeloza sodowa, celuloza sproszkowana, talk, symetykon, krzemionka koloidalna, bezwodna. Otoczką: sacharoza, talk, wapnia węglan, makrogol 6000, powidon K90, makrogol 4000, TER LMF M FICHTENGRÜN: - sodu siarczan (E 514) - tartrazyna (E 102) - błękit brylantowy (E 133), tytanu dwutlenek (E

171), szelak, olej kakaowy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Ibuprom Zatoki Tabs jeśli pacjent: ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; ma lub miał w przeszłości krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje; ma krwawienie wewnątrzczaszkowe lub inny rodzaj krwawienia; ma ciężką niewydolność wątroby; ma ciężką niewydolność nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); chorobę wieńcową; ma nadciśnienie tętnicze; ma niewyjaśnione zaburzenia hematologiczne; ma skazę krwotoczną; ma cukrzycę; ma guza chromochłonnego nadnerczy; ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania; ma nadczynność tarczycy; ma rozrost gruczołu krokowego.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 pacjentów na 100 stosujących lek): Zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.
- Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek): Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórą i świądem, także napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego). Bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie. Zaburzenia widzenia. Owrzodzenia przewodu pokarmowego, z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.
- Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek): Reakcje nadwrażliwości, od świądu i wysypki, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli. Podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, błądność skóry. Szumy uszne. Martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.
- Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) Reakcje psychotyczne, depresja, lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy. Nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby. Ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów mających: Toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej; reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego; choroby układu pokarmowego lub przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna); zaburzenia czynności nerek lub wątroby; zaburzenia krwi (np. wrodzona porfiria przerywana, zaburzenia płytek krwi); czynna lub przebyta astma oskrzelowa lub choroby alergiczne; niewydolność oddechowa; ospę wietrzną.
- Jedna tabletkę zawiera 31,66 mg sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
- Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław