

Iburapid, 400 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 6,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBURAPID
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Iburapid to lek zawierający ibuprofen, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Łagodzi bóle różnego pochodzenia, gorączkę oraz bolesne miesiączkowanie.

Wskazania

- Ból o nasileniu słabym do umiarkowanego, różnego pochodzenia - bóle głowy w tym napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle stawowe, bóle kostne, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie,
- Gorączka towarzysząca grypie, przeziębieniu, innym chorobom zakaźnym,
- Bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Iburapid zawiera ibuprofen należący do NLPZ - niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leki z tej grupy wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Młodzież od 12 lat i dorośli (o masie ciała 40 kg lub większej): 1 tabletka (400 mg) nie częściej niż co 6 godzin. Dawka dobową nie powinna przekraczać 1200 mg, czyli 3 tabletek.
- Migrena: początkowo 1 tabletka (400 mg), w razie potrzeby 1 tabletka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletek czyli 1200 mg ibuprofenu.

Skład

- Substancją czynną jest: ibuprofen (Ibuprofenum).
- 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwien

koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Iburapid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne substancje; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby,
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie), perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ,
- w ciężkiej niewydolności serca (klasa IV wg NYHA),
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem),
- w przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych,
- w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2,
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
- u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- niestrawność, nudności, ból brzucha,
- pokrzywka, świąd, wysypki,
- bóle głowy,
- zaburzenia widzenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- wzdęcia, zaparcia, biegunka, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- dezorientacja, bezsenność, depresja, omamy,
- drażliwość, zmęczenie, zawroty głowy,
- szumy uszne.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zaburzenia wskaźników morfologii krwi,
- zaburzenia czynności wątroby,
- rumień wielopostaciowy,
- smółkowe stolce, krwawe wymioty, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,
- obrzęki, zmniejszenie ilości wydalanego moczu,
- reakcje nadwrażliwości,
- nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.

Ostrzeżenia

- Lek stosować ostrożnie u osób z: zaburzoną czynnością wątroby i/lub nerek, chorobami układu krążenia, astmą oskrzelową, alergią, ospą wietrzną, schorzeniami układu krwiotwórczego, chorobami przewodu pokarmowego, zaburzeniami rytmu serca,

cukrzycą.

- Lek stosować ostrożnie u osób, które są po dużym zabiegu chirurgicznym oraz przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.
- U osób powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Ibuprofen stosować ostrożnie jeśli jednocześnie przyjmowane są kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (acenokumaryl), leki antyagregacyjne (ASA).
- Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124) i azorubinę (E 122) - składniki te mogą wywołać reakcję alergiczną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

„Nord Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa