

Iburapid, 400 mg, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 10,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBURAPID
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki powlekane **Iburapid** są środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi. Zawierają ibuprofen, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten skutecznie łagodzi ból i gorączkę pochodzenia różnego oraz bolesne miesiączkowanie.

Wskazania

Tabletki Iburapid stosuje się w bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego, różnego pochodzenia - bóle głowy w tym napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle stawowe, bóle kostne, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Wskazaniem do zastosowania leku jest gorączka towarzysząca grypie, przeziębieniu, innym chorobom zakaźnym czy bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Iburapid zawiera ibuprofen należący do NLPZ - niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leki z tej grupy wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dawkowanie Iburapidu dla młodzieży od 12 lat i dorośli (o masie ciała 40 kg lub większej): 1 tabletka (400 mg) nie częściej niż co 6 godzin. Dawka dobową nie powinna przekraczać 1200 mg, czyli 3 tabletek. W przypadku migreny początkowo stosuje się 1 tabletka (400 mg), w razie potrzeby 1 tabletka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletek, czyli 1200 mg ibuprofenu.

Skład

- Substancją czynną jest: ibuprofen (Ibuprofenum).
- 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek

(E 171), makrogol 6000, czerwień

koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuparid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne substancje; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej,

obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżyty nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ,

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby,
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie), perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ,
- w ciężkiej niewydolności serca (klasa IV wg NYHA),
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem),
- w przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych,
- w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2,
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
- u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): niestrawność, nudności, ból brzucha, pokrzywka, świąd, wysypki, bóle głowy, zaburzenia widzenia.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): wzdęcia, zaparcia, biegunka, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, dezorientacja, bezsenność, depresja, omamy, drażliwość, zmęczenie, zawroty głowy, szumy uszne.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zaburzenia wskaźników morfologii krwi, zaburzenia czynności wątroby, rumień wielopostaciowy, smołowate stolce, krwawe wymioty, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, obrzęki, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, reakcje nadwrażliwości, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.

Ostrzeżenia

- Lek stosować ostrożnie u osób z: zaburzoną czynnością wątroby i/lub nerek, chorobami układu krążenia, astmą oskrzelową, alergią, ospą wietrzną, schorzeniami układu krwiotwórczego, chorobami przewodu pokarmowego, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą.
- Lek stosować ostrożnie u osób, które są po dużym zabiegu chirurgicznym oraz przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.
- U osób powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Ibuprofen stosować ostrożnie jeśli jednocześnie przyjmowane są kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol), leki antyagregacyjne (ASA).
- Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124) i azorubinę (E 122) - składniki te mogą wywołać reakcję alergiczną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

„Nord Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa