

Ibuvit D3 2000 IU, 2000 IU, kapsułki miękkie, 90 kapsułek

Cena: 42,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUVIT
Opakowanie	90 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 11 lat

Opis produktu

Opis

Ibuvit D3 2000 IU w kapsułkach miękkich to lek zawierający cholekalcyferol w dawce 2000 jednostek międzynarodowych, identyczny z witaminą D produkowaną przez organizm ludzki. Stosowany w profilaktyce niedoborów witaminy D3 (szczególnie od października do maja) oraz osteoporozy. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 11 roku życia o prawidłowej masie ciała.

Wskazania

Ibuvit D 2000 IU stosuje się w celu dostarczenia do organizmu witaminy D. Jest ona podawana w profilaktyce krzywicy i osteomalacji. Wskazaniem do zastosowania leku jest również zapobieganie stanom związanym z niedoborem witaminy D u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz po konsultacji z lekarzem u kobiet w ciąży lub planujących ją, jak również w okresie laktacji. Ibuvit D podaje się dzieciom i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej w profilaktyce niedoboru witaminy D. Produkt leczniczy można również stosować jako środek wspomagający leczenie osteoporozy u dorosłych.

Działanie

Ibuvit D 2000 IU dostarcza witaminę D, która odpowiada za wchłanianie wapnia z jelit oraz ogranicza wydalanie go z moczem, wspierając budowę kości.

Dawkowanie

- Dorośli oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej: 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
- Dorośli wspomagająco w leczeniu osteoporozy: 1 kapsułka na dobę, niezależnie od pory roku.

Skład

- Substancją czynną leku jest cholekalcyferol.
- 1 kapsułka miękka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D.
- Substancje pomocnicze: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z uczuleniem na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do przyjmowania Ibutitu D 2000 IU są: hiperkalcemia, hiperkalciuria; ciężka niewydolność nerek, kamienie na nerkach; hiprewitaminoza witaminy D.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące (u mniej niż 1 na 100 pacjentów): podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), podwyższone stężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria).
- Rzadko występujące (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): wysypka, świąd, pokrzywka.
- Częstość nieznana: zaparcia, gazy (wzdęcia), nudności, ból brzucha, biegunka.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku prawdopodobieństwa, że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania Ibutit D3 2000 IU, osób z uszkodzonymi czy chorymi nerkami lub leczenie witaminą D jest długotrwałe.

Ibutit D3 2000 IU najlepiej przyjmować razem z głównym posiłkiem w celu ułatwienia wchłaniania witaminy D.

Producent

POLPHARMA SA
Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

