

Ibuvit D3 4000 IU, 4000 IU, kapsułki miękkie, 60 kapsułek

Cena: 46,39 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IBUVIT
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ibuvit D3 4000 IU to lek zawierający cholekalcyferol, w formie miękkich kapsułek dostarczających witaminę D. Jest ona kluczowym składnikiem diety, szczególnie w miesiącach od października do kwietnia, gdy organizm nie produkuje jej w wystarczających ilościach. Witamina D wspiera budowę kości i zapobiega osteomalacji. Ibuvit D3 4000 IU stosuje się w profilaktyce niedoborów witaminy D3 oraz w stanach wynikających z jej niedoboru u dorosłych z otyłością.

Działanie

Działanie Ibuvitu D 4000 IU polega na dostarczaniu witaminy D do organizmu. Jest ona ważnym elementem podczas procesu tworzenia kości oraz wspiera mineralizację kości.

Dawkowanie

Lek należy stosować doustnie, popijając kapsułki w całości podczas głównego posiłku. Dawkowanie Ibuvitu D 4000 IU od kwietnia do maja w profilaktyce niedoboru cholekalcyferolu oraz stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością to 1 kapsułka dziennie.

Skład

- Substancją czynną leku jest cholekalcyferol.
- 1 kapsułka miękka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4000 IU witaminy D.
- Składniki pomocnicze: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z uczuleniem na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników Ibuvit D 4000 IU. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest również: zbyt wysokie stężenie wapnia w moczu lub krwi; kamienie na nerkach, niewydolność nerek; hiperwitaminoza witaminy D.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące (u mniej niż 1 na 100 pacjentów): podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), podwyższone stężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria).
- Rzadko występujące (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): wysypka, świąd, pokrzywka.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaparcia; gazy (wzdęcia); nudności; ból brzucha; biegunka.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: osób z sarkoidozą, przyjmowania dodatkowych źródeł wapnia, pacjentów z uszkodzonym lub chorymi nerkami, długotrwałego leczenia witaminą D.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

Polpharma
Bobrowiecka 6
00-782 Warszawa

Galeria



ibuvit D₃ 4000



**Pierwszy i jedyny
lek OTC z witaminą D
w dawce 4000 IU
w postaci kapsułek²**

2. Na podstawie CDR, produktów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych na dzień 16.01.2025 r.

ibuvit D₃ 4000



**Tylko witamina D
i naturalny olej z krokosza**

PROSTY SKŁAD KAPSUŁKI