

Imodium Instant, 2 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 tabletek



Cena: 17,73 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Imodium Instant to lek przeciwbiegunkowy stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.

Wskazania

- Ostra i przewlekła biegunka,
- Zmniejszenie liczby i objętości stolców u osób z wytworzoną przetoką jelita krętego,
- Objawowe leczenie biegunki w zespole jelita drażliwego.

Działanie

Imodium Instant należy do leków hamujących perystaltykę jelit, jest lekiem przeciwbiegunkowym. Loperamid zmniejsza m.in. natychmiastową potrzebę wypróżnienia.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletki (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletki (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletki (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 mg do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej bieguncie - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg masy ciała).

Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego

- Dorośli od 18 roku życia:

Początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę a następnie 1 tabletką (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu lub według dawkowania uprzednio zaleconego przez lekarza. Lek Imodium Instant można stosować przez okres do 2 tygodni przy powtarzających się atakach, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin przy pojedynczych napadach biegunki.

Dawka maksymalna w bieguncie związanej z zespołem jelita drażliwego - 6 tabletek (12 mg) na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: chlorowodorek loperamidu (Loperamidi hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Imodium Instant:

- jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat,
- jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania,
- w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Stosowanie leku Imodium Instant należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- bóle i zawroty głowy,
- zatwardzenie, nudności, wzdęcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- bezsenność,
- bóle i dolegliwości w obrębie brzucha, ból w nadbrzuszu,
- suchość w jamie ustnej,
- wymioty, niestrawność,
- wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcja nadwrażliwości,
- nieprawidłowa koordynacja, obniżony poziom świadomości, utrata świadomości,
- senność, otępienie,
- niedrożność jelita,
- rozszerzenie okrężnicy,
- wysypka, świąd, pokrzywka,
- zwężenie żrenicy,
- zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia

- Leczenie biegunki lekiem jest jedynie leczeniem objawowym.
- Dzieci są szczególnie wrażliwe na ryzyko odwodnienia i utraty elektrolitów - należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów.
- W przypadku braku poprawy w ciągu 48 godzin w leczeniu biegunki ostrej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Pacjenci z AIDS, stosujący lek Imodium Instant z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
- U pacjentów przyjmujących zbyt duże dawki loperamidu (substancji czynnej leku Imodium Instant) notowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).
- Pacjenci z zespołem jelita drażliwego, stosując lek powinni zwrócić uwagę na występujące nowe objawy, zmianę masy ciała, częstość i charakter występujących biegunek / zaparć.
- Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
- Lek Imodium Instant zawiera śladowe ilości siarczynów w kompozycji smakowo-zapachowej miętowej. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

MCNEIL C/O JOHNSON&JOHNSON

Galeria

