

# Imodium Instant Lek przeciwbiegunkowy bez popijania smak miętowy 12 sztuk

Cena: 21,81 zł



## Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	IMODIUM
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Imodium Instant** to lek przeciwbiegunkowy dostępny w postaci tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej o smaku miętowym. Główną substancją czynną w tym leku jest loperamid. Loperamid działa na kilka sposobów: zmniejsza ruchliwość jelit, wydłuża czas, który pokarm potrzebuje na przejście przez jelita, zwiększa napięcie mięśni zwieracza odbytu i redukuje uczucie potrzeby wypróżnienia. Każda tabletki zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu, co sprawia, że jest to substancja przeciwbiegunkowa.

### Wskazania

Objawowe leczenie:

- ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat,
- biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego (IBS) u osób dorosłych.

### Działanie

Przeciwbiegunkowe.

### Dawkowanie

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki:

- Dorośli: początkowo 2 tabletki (4 mg).
- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: początkowo 1 tabletki (2 mg).

Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego:

- Dorośli od 18 roku życia: początkowo 2 tabletki (4 mg) na dobę.

#### Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2 mg,
- pozostałe składniki: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Imodium Instant:

- jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat,
- jako leczenia zasadniczego u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit,
- w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit.

#### Działania niepożądane

- ból głowy, zawroty głowy,
- zatwardzenie, wzdęcia i nudności.
- suchość w jamie ustnej,
- bezsenność,

#### Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

#### Ostrzeżenia

- Stosowanie leku Imodium Instant należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności.
- U pacjentów z biegunką, szczególnie u dzieci, może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów, więc w czasie choroby należy przyjmować większą niż zwykle ilość płynów.
- Jeżeli po podaniu leku w ostrej biegunce w ciągu 48 godzin objawy nie ustąpią, należy przerwać podawanie leku Imodium Instant i skonsultować się z lekarzem.
- Pacjenci z AIDS stosujący lek Imodium Instant z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.