

Inaldin Gardło Max, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml



Cena: 32,77 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	INALDIN
Opakowanie	30 ml
Postać	Aerozol
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Inaldin Gardło to leczniczy aerozol na ból jamy ustnej i gardła, stosowany w stanach zapalnych z zaczerwienieniem i obrzękiem. Zawiera substancję czynną łagodzącą stan zapalny, ból oraz miejscowo znieczulającą błony śluzowe.

Wskazania

Leczenie objawowe (ból, obrzęk, zaczerwienienia) stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Lek Inaldin Gardło Max zawiera benzydaminę, która działa odkażająco, przeciwzapalnie i znieczula miejscowo oraz zmniejsza obrzęk.

Dawkowanie

Dorośli Zalecana dawka aerozolu to od 2 do 4 dawek każdorazowo (zawierających od 1,02 do 2,04 mg benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada od 0,91 do 1,82 mg benzydaminę) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Skład

- Substancją czynną leku jest: chlorowodorek benzydaminę (Benzydaminę hydrochloridum).
- 1 ml roztworu zawiera 3 mg chlorowodoru benzydaminę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Inaldin Gardło Max: w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną - benzydaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego.

Działania niepożądane

- Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) – nadwrażliwość na światło.
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) – pieczenie i suchość w jamie ustnej.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) – trudności w oddychaniu lub przełykaniu (skurcz krtani lub skurcz oskrzeli).

Ostrzeżenia

- Stosowanie produktu leczniczego Inaldin Gardło należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa na kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ lub jeśli w przeszłości wystąpiła astma.
- Jeśli podczas stosowania wystąpiły owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, należy skonsultować się z lekarzem.
- Po zastosowaniu aerozolu może wystąpić pieczenie/drętwienie w jamie ustnej/gardle - tego typu reakcja jest normalna - związana z profilem działania leku i ustępuje po krótkim czasie.
- Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami.
- Produkt leczniczy zawiera E218 - parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne.
- Inaldin Gardło zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg w 1 dawce).
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Dublin 24, D24PPT3 Irlandia