

Inovox Express, pastylki twarde, smak miodowo-cytrynowy, 36 pastylek



Cena: 46,86 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	36 pastylek
Postać	Pastylki twarde
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Przeciwbakteryjne, Przeciwbólowe, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis
INOVOX Express to lek łagodzący ból gardła, który dodatkowo działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo.

Wskazania
Inovox Express stosuje się do:

- miejscowego leczenia antyseptycznego stanów zapalnych gardła i jamy ustnej,
- łagodzenie objawów bólu gardła.

Działanie
Inovox Express zawiera antyseptyki - amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek miejscowo znieczulający - lidokainy chlorowodorek. Antyseptyki odpowiadają za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Substancje te wykazują również właściwości przeciwwirusowe. Lidokaina redukuje ból gardła dzięki czemu ułatwia przełykanie.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę.

Skład
Substancjami czynnymi leku są lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.
Substancje pomocnicze: olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, żółcień chinolinowa (E104), sodowa sacharyna (E954), kwas winowy (E334), sacharoza, glukoza ciekła, żółcień pomarańczowa (E110), aromat cytrynowy, substancja o smaku miodu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Inovox Express:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 osoby na 1000):

- reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd),
- obrzęk naczynioruchowy,
- pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.

Ostrzeżenia

- Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się.
- Przed zastosowaniem u astmatyków należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale, może wpływać na serce lub układ nerwowy i może powodować drgawki.
- Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.
- Lek może być szkodliwy dla zębów.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław