

Inuprin Forte 1000 mg, 30 tabletek

Cena: 44,22 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Inuprin Forte 1000 mg to lek bez recepty, stosowany u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawrotów infekcji górnych dróg oddechowych, oraz w leczeniu opryszczki na wargach i skórze twarzy spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Jego substancją czynną jest inozyna pranobeks, która wykazuje podwójne działanie. Po pierwsze, działa przeciwwirusowo, eliminując przyczynę infekcji górnych dróg oddechowych, oraz stymuluje funkcje układu immunologicznego, wspomagając wzmocnienie odporności organizmu. Po drugie, hamuje rozmnażanie wirusów Herpes, które są odpowiedzialne za wystąpienie opryszczki.

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) - lek Inuprin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Działanie

Przeciwwirusowe i zwiększające odporność organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle dawka dobową wynosi 3 tabletki (3g) w ciągu doby (czyli 1 tabletka 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki (4g) w ciągu doby (czyli 1 tabletka 4 razy na dobę).
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie leku INUPRIN FORTE w syropie.

Skład

1 tabletka leku zawiera:

- substancję czynną: 1000 mg inozyiny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3),
- substancje dodatkowe: celuloza mikrokryształiczna, kroscarmeloza sodowa, poliwinylpirolidon K90, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną (inozyiny pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Aktualny napad dny moczanowej (objawiający się silnym bólem stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięgu) lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi wykazane w aktualnych badaniach badania.
- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1. roku życia.

Działania niepożądane

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez,
- ból brzucha,
- ból głowy lub zawroty głowy,
- zmęczenie, złe samopoczucie,
- bóle stawów,
- swędzenie, wysypka skórna.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

- biegunka,
- zaparcia,
- nerwowość,
- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
- wielomocz (wydalenie dużej ilości moczu).

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;
- jeśli pacjent miał kamice nerkową;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;
- jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn