

# Inventum Max 50 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Cena: 31,99 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla mężczyzn                                      |
| Marka           | INVENTUM                                          |
| Opakowanie      | 4 tabletki                                        |
| Postać          | Tabletka                                          |
| Producent       | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.               |
| Przeznaczenie   | Wspomagające sprawność seksualną,<br>Wzmacniające |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                   |
| Wiek            | Dla dorosłych                                     |

## Opis produktu

### Opis

**Inventum Max** to lek w formie tabletek do rozgryzania i żucia, przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Każda tabletki zawiera 50 mg syldenafilu, substancji czynnej należącej do inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Inventum Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi podczas podniecenia seksualnego. Lek pomaga w osiągnięciu wzwodu wyłącznie przy uprzednim pobudzeniu seksualnym.

### Wskazania

Lek Inventum Max 50 mg stosuje się:

- u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożliwość uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

### Działanie

Lek Inventum Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, prowadząc do zwiększenia napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

### Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: jeżeli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W innym przypadku lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko wtedy, gdy pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku (czyli nie odczuł pożądanego efektu). W sytuacji, gdy zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji pozwalającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg.

### Skład

1 tabletki do rozgryzania lub żucia zawiera:

- substancję czynną: syldenafil 50 mg (tworzącego się in situ z 70,24 mg cytrynianu syldenafilu),
- pozostałe składniki: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroscarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30.

### Przeciwwskazania

Nie stosować leku Inventum Max u pacjentów z uczuleniem na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku są ciężkie choroby serca lub wątroby, niskie ciśnienie tętnicze krwi oraz niedawno przebyty udar czy zawał serca.

### Działania niepożądane

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy.

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność;
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia;
- uczucie zatkanego nosa;
- zawroty głowy.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- wymioty, wysypka skórna;
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu;
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;
- bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach;
- suchość w jamie ustnej, zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawiające się katarrem, kichaniem i zatkanym nosem);
- ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawiająca się zgagą);
- krew w moczu;
- ból rąk lub nóg;
- krwawienie z nosa;
- uczucie gorąca;
- uczucie zmęczenia.

Rzadko (u 1 na 1000 pacjentów):

- omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu;
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust;
- krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie;
- zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek,
- niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła;
- rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka;
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie;
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa;
- uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

### Ostrzeżenia

Lek zawiera aspartam oraz laktozę, więc może być źródłem fenyloalaniny (szkodliwej dla chorych na fenyloketonurię), a osoby z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem produktu leczniczego powinny skonsultować się z lekarzem.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

#### Producent

AFLOFARM  
Partyzancka 133/151  
Pabianice

#### Galeria

---

