


Itami, 140 mg, plastry lecznicze, 10 sztuk

Cena: 127,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ITAMI
Opakowanie	10 plastrów
Postać	Plastry
Producent	FIDIA FARMACEUTICI SPA
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Itami to leczniczy plaster przeznaczony do krótkotrwałego stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Stosowany miejscowo do objawowego leczenia bólu związanego z nadwyrężeniami, zwichnięciami i stłuczeniami.

Wskazania

Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu spowodowanego tępyimi urazami (np. urazy sportowe), takimi jak: zwichnięcia, ostre nadwyrężenia lub siniaki kończyn.

Działanie

Itami jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zawarty w Itami diklofenak należy do NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działanie diklofenaku jest związane z ograniczeniem bólu pochodzącego od stanu zapalnego, opuchlizny czy gorączki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Skład

- Substancją czynną jest diklofenak sodowy.
- Jeden plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.
- Substancje pomocnicze: metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, akrylanów kopolimer, makrogolu 12 stearynian, sorbitanu oleinian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itami:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen);
- jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ kiedykolwiek wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa;
- u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
- w okresie karmienia piersią bezpośrednio na skórę piersi;
- na uszkodzoną skórę;
- w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży;
- u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- miejscowe reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, czerwona zaogniona skóra, wysypka, czasami z krostkami lub bąblami pokrzywkowymi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry).

Producent

FIDIA

Galeria

