


Itami, 140 mg, plastry lecznicze, 2 sztuki

Cena: 25,95 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ITAMI
Opakowanie	2 plastry
Postać	Plastry
Producent	FIDIA FARMACEUTICI SPA
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Itami to leczniczy plaster przeznaczony do krótkotrwałego stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Stosowany miejscowo do objawowego leczenia bólu związanego z nadwyrężeniami, zwichnięciami i stłuczeniami.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania plastrów Itami są miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu spowodowanego tępyimi urazami (np. urazy sportowe), takimi jak:

- zwichnięcia,
- ostre nadwyrężenia,
- siniaki kończyn.

Działanie

Itami jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zawarty w Itami diklofenak należy do NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działanie diklofenaku jest związane z ograniczeniem bólu pochodzącego od stanu zapalnego, opuchlizny czy gorączki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Skład

- Substancją czynną jest diklofenak sodowy.
- Jeden plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.
- Substancje pomocnicze: metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, akrylanów kopolimer, makroglu 12 stearynian, sorbitanu oleinian; poliestrowa warstwa nośna: papierowa monosilikonowa warstwa ochronna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itami:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen);
- jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ kiedykolwiek wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa;
- u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
- w okresie karmienia piersią bezpośrednio na skórę piersi;
- na uszkodzoną skórę;
- w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży;
- u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- miejscowe reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, czerwona zaogniona skóra, wysypka, czasami z krostkami lub bąblami pokrzywkowymi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry).

Ostrzeżenia

- Leku nie może być stosowany ani nie może mieć styczności z oczami ani błonami śluzowymi.
- Należy zachować dużą ostrożnością, w przypadku osób w podeszłym wieku, gdyż są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych.
- Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Itami, jeśli po nałożeniu plastra rozwija się wysypka skórna, a także gdy wystąpią zaburzenia nerek, serca lub wątroby, bądź jeśli pacjent cierpiał lub cierpi na chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, czy też zapalenie jelit, bądź ma skłonność do krwawienia.
- Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło, po zdjęciu plastra należy unikać wystawiania leczonych obszarów na działanie promieni słonecznych i naświetlanie w solarium.

Producent

FIDIA

Galeria

