


Itami, 140 mg, plastry lecznicze, 5 sztuk

Cena: 67,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ITAMI
Opakowanie	5 plastrów
Postać	plaster
Producent	FIDIA FARMACEUTICI SPA
Przeznaczenie	Ból, Siniaki, Stan zapalny, Stłuczenie, Zwichnięcie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Itami to produkt leczniczy w postaci plastrów, które wykazują działanie przeciwbólowe po zastosowaniu na skórę. Głównym składnikiem aktywnym w preparacie jest diklofenak sodowy, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Plastry Itami przeznaczone są do stosowania u dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia w celu miejscowego, krótkotrwałego i objawowego łagodzenia bólu, zwłaszcza w przypadku ostrych urazów, zwichnięć, siniaków i innych urazów kończyn. Każdy plaster samoprzylepny ma wymiary 14 cm x 10 cm i jest pakowany osobno w szaszetce.

Wskazania

Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć, siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, w tym urazów sportowych.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Skład

1 plaster leczniczy zawiera:

- substancję czynną: diklofenak sodowy 140 mg,
- pozostałe składniki: metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, akrylanów kopolimer, makroglu 12 stearynian, sorbitanu oleinian, poliestrowa warstwa nośna (papierowa monosilikonowa warstwa ochronna).



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itami:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen);
- jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ kiedykolwiek wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa;

u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

- w okresie karmienia piersią bezpośrednio na skórę piersi;
- na uszkodzoną skórę;
- w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży;
- u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

Miejscowe reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, czerwona zaogniona skóra, wysypka, czasami z krostkami lub bąblami pokrzywkowymi.

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Itami, jeśli

- po nałożeniu plastra rozwija się wysypka skórna,
- wystąpią zaburzenia nerek, serca lub wątroby, bądź jeśli pacjent cierpiał lub cierpi na chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, czy też zapalenie jelit, bądź ma skłonność do krwawienia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (Padova), Włochy

Galeria

