

Izovag, 10 mg/g, krem dopochwowy, 40 g

Cena: 51,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	40 g
Postać	Krem dopochwowy
Producent	ARISTO PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwygrzybicze
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Izovag to krem dopochwowy o działaniu przeciwygrzybiczym, stosowany w leczeniu grzybicy pochwy oraz zakażeń mieszanych z bakteriami Gram-dodatnimi. Produkt zawiera aplikator dopochwowy, co ułatwia jego stosowanie. Przeznaczony jest dla kobiet powyżej 15 roku życia.

Wskazania

Izovag stosuje się w grzybicy pochwy oraz w mieszanych infekcjach pochwy z bakteriami Gram-dodatnimi.

Działanie

Izovag działa przeciwygrzybiczo oraz na bakterie gram-dodatnie.

Dawkowanie

Lek podaje się dopochwowo. Za pomocą dołączonego aplikatora należy wprowadzić krem najgłębiej jak to możliwe, zaleca się w pozycji leżącej. Nie kontynuować leczenia w czasie menstruacji.

Skład

- Substancją czynną leku jest azotan izokonazolu.
- 1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu.
- Pozostałe składniki to: polisorbitat 60, sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować Izovagu u pacjentek nadwrażliwych na izokonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko mogą występować działania niepożądane w miejscu podania, takie jak: pieczenie i świąd. Możliwe jest także występowanie reakcji alergicznych takich jak: wysypka, obrzęk, nudności, duszność, niedociśnienie tętnicze.



Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku oraz tydzień po zakończeniu nie należy wykonywać płukania (irygacji) pochwy.
- Krem Izovag może uszkadzać latek, więc podczas stosowania kremu oraz 5 dni po należy oprócz prezerwatywy należy używać dodatkowych metod.
- W celu leczenia zakażeń zewnętrznych okolic narządów płciowych lub profilaktycznego leczenia partnera pacjentki, zaleca się stosowanie kremu zawierającego izokonazolu azotan.
- Aby zapobiec nawrotom zakażenia należy nosić bawełnianą bieliznę. Powinna być ona codziennie zmieniana na czystą, wcześniej wypraną i wygotowaną. Ręczniki z jakich korzystała pacjentka również po użyciu powinny być wygotowane.
- Izvoag posiada w składzie alkohol cetostearylowy, mogący wywoływać miejscowe reakcje alergiczne.

Producent

AXXON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
02-867 Warszawa