

Ketokaps Max 50 mg, 20 kapsułek miękkich



Cena: 25,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	KETOKAPS
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Ketokaps Max 50 mg to lek przeciwbólowy dostępny w formie miękkich kapsułek, zawierający ketoprofen w dawce 50 mg na kapsułkę, co stanowi najwyższą dawkę ketoprofenu dostępną bez recepty. Ketoprofen, będący substancją czynną, należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Lek może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież poniżej 15 roku życia.

Wskazania

Lek Ketokaps Max 50 mg stosuje się:

- w objawowym leczeniu ostrego bólu różnego pochodzenia, w tym: bóli mięśniowych, kostno-stawowych, bóli głowy, zębów oraz bolesnego miesiączkowania;
- bóle o nasileniu od łagodnych do umiarkowanych.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: zalecana dawka 1 kapsułka do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: ketoprofen 50 mg,
- substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, woda oczyszczona,

otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły - częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ketokaps Max.
- Jeśli w przeszłości wystąpiły duszność, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa lub reakcja skórna (objawiająca się obrzękiem skóry lub swędzącą wysypką) albo innego rodzaju reakcji alergicznej po zastosowaniu ketoprofenu lub podobnie działających leków takich jak kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ).
- Trzeci (III) trymestr ciąży.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, a także, gdy w przeszłości występowało krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego.
- Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek.
- Skaza krwotoczna (skłonność do krwawień).
- Nie stosować u dzieci poniżej 15 lat.

Działania niepożądane

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób):

- niestrawność, nudności, bóle brzucha, wymioty, astenia, złe samopoczucie.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób):

- reakcje alergiczne: wysypka, świąd, zaczerwienienie;
- ból głowy, zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), senność;
- zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka;
- obrzęki (zatrzymanie wody);
- zmęczenie.

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób):

- niedokrwistość spowodowana krwotokiem lub krwawieniem;
- szumy uszne (dzwonienie w uszach);
- wrażenia czuciowe (parestezje);
- zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie);
- napad astmy oskrzelowej, duszności;
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka;
- zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększone stężenie bilirubiny w osoczu spowodowane zapaleniem wątroby;
- zwiększenie masy ciała.

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

- agranulocytoza;
- trombocytopenia;
- zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia;
- reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny);
- dezorientacja, zaburzenia nastroju, omamy, depresja;
- jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, drgawki, zawroty głowy;
- niewydolność serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń, zapalenie naczyń;
- skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa;
- zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacje, zapalenie trzustki;
- nadwrażliwość skóry na światło, łysienie, pokrzywka, reakcje pęcherzowe w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwice oddzielanie się naskórka;
- ostra uogólniona osutka krostkowa;
- obrzęk naczynioruchowy;
- ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności tego narządu i (lub) u pacjentów odwodnionych, cewkowo-



śródmiażdżowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek;

- zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność u Pacjentów w podeszłym wieku ze schorzeniami przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, niekontrolowanym nadciśnieniem, chorobami serca i naczyń, cukrzycą i palących tytoń oraz odwodnionych i w przebiegu zakażeń.
- Produkt zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.
- Kapsułki Ketokaps Max zawierają sorbitol.
- W przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

PPF Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław