

Ketonal Sprint, 25 mg, granulki do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek

Cena: 24,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	KETONAL
Opakowanie	12 saszetek
Postać	granulki
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Ketonal Sprint to lek dostępny bez recepty dla dorosłych i młodzieży, łagodzący lekki lub umiarkowany ból różnego pochodzenia. Zawiera ketoprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Preparat ma formę granulatu do rozpuszczania.

Wskazania

Saszetki Ketonal Sprint stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle głowy, bóle zębów, mięśni, bóle kości i stawów, bóle pourazowe, ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami oraz bóle menstruacyjne.

Działanie

Substancją czynną produktu leczniczego Ketonal Sprint jest ketoprofen - lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: Jedna saszetka do 3 razy na dobę (co 8 godzin) podczas posiłku.

Skład

- Substancją czynną leku jest ketoprofen (ketoprofenum).
- Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg).
- Substancje pomocnicze: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ketonal Sprint:

- Jeśli pacjent jest uczulony na ketoprofen lub jakikolwiek inny składnik leku.
- Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np. ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku (napad astmy, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, pokrzywka, świąd nosa lub wodnisty wyciek z nosa).
- Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości: astma; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; chorobę Leśniowskiego-Crohna; ciężka niewydolność serca; ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek; skłonność do krwawień.
- Leku Ketonal Sprint nie należy stosować jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): zapalenie błony śluzowej żołądka; zaparcie, biegunka, gazy; wysypka skórna, świąd; zatrzymanie wody, które może powodować obrzęk rąk lub nóg; ból głowy, zawroty głowy lub senność; odczucie zmęczenia lub złe samopoczucie; odczucie zawrotów głowy lub „wirowania”.
- Rzadko występujące działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): dzwonienie w uszach; zwiększenie masy ciała; owrzodzenie i zapalenie jamy ustnej.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u jednej na 10 000 osób): niekontrolowane rytmiczne ruchy warg, języka i mięśni twarzy (określane jako dyskineza); omdlenie; niskie ciśnienie krwi; obrzęk twarzy; uczucie osłabienia.
- Częstość nieznana: niewydolność serca z takimi objawami, jak duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej; obrzęk stóp lub nóg; czucie bicia serca; wysokie ciśnienie krwi; zaczerwienienie skóry; przyspieszona czynność serca, nieregularna czynność serca; zmiany nastroju, splątanie, pobudliwość, trudności w zasypianiu; zmiany w odczuwaniu smaku, zgaga; obrzęk wokół oczu; katar, świąd, kichanie i niedrożność nosa; utrata włosów; pokrzywka, zaczerwienienie i zapalenie skóry, wzniesiona wysypka; małe stężenie sodu we krwi; duże stężenie potasu we krwi; jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną (w tym leukocytoklastyczne zapalenie naczyń); zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha i pleców.

Ostrzeżenia

- Lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy Ketonal Sprint zawiera sód: ten lek na ból zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
- Przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych z grupy NLPZ takich, jak ketoprofen zwłaszcza w dużych dawkach i przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.
- Ważne jest, aby przyjmować Ketonal Sprint w minimalnej skutecznej dawce, przez okres jaki jest wymagany do złagodzenia objawów. Leku nie powinno się przyjmować większych dawek ani dłużej niż zalecane.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa