

Kidofen Max Ibuprofenum 250 mg/5 ml Zawiesina doustna 100 ml



Cena: 26,56 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 ml
Postać	Zawiesina
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Kidofen max to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, przeznaczony do stosowania w sytuacjach doraźnych. Zawiera ibuprofen, substancję czynną z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek występuje w postaci truskawkowej zawiesiny, nadającej mu charakterystyczny smak i zapach. Jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 3 miesięcy lub o masie ciała przekraczającej 5 kg. Opakowanie zawiera precyzyjną strzykawkę doustną, ułatwiającą odmierzenie dokładnej dawki.

Wskazania

Lek przeznaczony jest do doraźnego, objawowego leczenia bólu i gorączki różnego pochodzenia o słabym i umiarkowanym nasileniu.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5-7,6 kg): 3 razy po 1 ml w ciągu doby (150 mg ibuprofenu na dobę).
- Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7-9 kg): 3 do 4 razy po 1 ml w ciągu doby (150-200 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 1 do 3 lat (10-15 kg): 3 razy po 2 ml w ciągu doby (300 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 4 do 6 lat (16-20 kg): 3 razy po 3 ml w ciągu doby (450 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 7 do 9 lat (21-29 kg): 3 razy po 4 ml w ciągu doby (600 mg ibuprofenu na dobę).
- Dzieci od 10 do 12 lat (30-40 kg): 3 razy po 6 ml w ciągu doby (900 mg ibuprofenu na dobę).
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3 razy po 8 ml (1200 mg ibuprofenu na dobę) w leczeniu bólu i gorączki, do czasu ustąpienia objawów.

Skład

5 ml zawiesiny zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 250 mg,
- substancje pomocnicze: maltitol ciekły (E965), glicerol, sodu chlorek, kwas cytrynowy (E330), sodu cytrynian, sukraloza (E955), polisorbat 80, guma ksantan,

sodu benzoesan (E211), aromat truskawkowy (zawiera etanol, glikol propylenowy), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz inne leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
- Przeciwwskazane jest stosowanie u pacjentów, u których po terapii lekami NLPZ wystąpiło krwawienie lub perforacja z przewodu pokarmowego, z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, czynnymi krwawieniami, z ciężką niewydolnością wątroby i/lub nerek, serca oraz zaburzeniami wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu i z ciężkim odwodnieniem.
- Nie zaleca się stosowania leku w przypadku ospy wietrznej.

Ostrzeżenia

- W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i młodzieży, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 3 dni, lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

W przypadku dzieci w wieku 3-5 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.

- U niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała mniejszej niż 5 kg nie należy stosować produktu leczniczego, ponieważ nie ma wystarczająco dużo informacji na poparcie użycia go w tej grupie wiekowej.
- Stosowanie należy omówić z lekarzem w przypadku: niektórych chorób skóry lub tkanki łącznej, zaburzeń wytwarzania i krzepnięcia krwi, chorób jelit, nadciśnienia i niewydolności serca, zaburzeń czynności wątroby i nerek, astmy oskrzelowej, niedawno przebytych poważnych zabiegów chirurgicznych, wieku powyżej 65 lat.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

Galeria

