

Kopiryna, 400 mg + 50 mg, 6 tabletek

Cena: 2,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Kopiryna - tabletki przeciwbólowe to lek stosowany w przypadku bólu o lekkim i średnim nasileniu, takiego jak ból głowy, ból mięśni, ból menstruacyjny oraz gorączka.

Wskazania

- Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu (ból głowy, ból mięśni, ból menstruacyjny),
- Gorączka.

Działanie

Kopiryna wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. Kofeina zawarta w leku zmniejsza zmęczenie i zatrzymywanie płynów związanych z menstruacją.

Dawkowanie

- Dorośli: 1-2 tabletki do 3 razy na dobę.
- Dzieci od 12 roku życia: ½ - 1 tabletki do 3 razy na dobę.

Skład

Substancjami czynnymi są: kwas acetylosalicylowy, kofeina.
Substancja pomocnicza: skrobia ziemniaczana.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kopiryna:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne, inne salicylany, inne NLPZ lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli u pacjenta występują: ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca; ciężkie niewyrównane nadciśnienie; czynna choroba wrzodowa żołądka i

dwunastnicy; krwawienie z przewodu pokarmowego; skaza krwotoczna (ogólna skłonność do krwawień),

- jeśli w przeszłości występowały napady astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (szczególnie NLPZ),
- u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią,
- w przypadku stosowania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, a także w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Rey'a),
- przed zabiegami chirurgicznymi (5 dni).

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- ból żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność,
- zapalenie i krwawienia z przewodu pokarmowego,
- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
- zaburzenia czynności wątroby,
- ból głowy przy długotrwałym stosowaniu,
- zawroty głowy, szumy uszne,
- zwiększone ryzyko krwawień,
- reakcje uczuleniowe: astma, łagodne reakcje skórne (wysypka, pokrzywka), zaburzenia pracy serca,
- bezsenność, niepokój,
- kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku: astmy oskrzelowej, chorób dróg oddechowych, zaburzeń krzepnięcia, podwyższonego ciśnienia krwi, zaburzeń czynności serca, dny moczanowej, zaburzonej czynności nerek i wątroby, występującej w przeszłości choroby wrzodowej.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek.
- Leku nie należy stosować razem z alkoholem i tytoniem.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

MEDICOFARMA S.A.
Tarnobrzeska 13
Radom